

Die
Ätiologie der Beckenendlage

mit Beziehung auf die
in den letzten 21 $\frac{1}{2}$ Jahren in der Frauenklinik zu München
vorgekommenen Beckenendlagen.

Inaugural - Dissertation

verfasst und der
hohen medicinischen Facultät der Ludwig-Maximilians-
Universität

unter dem Präsidium des
Herrn Geheimraths Professor Dr. F. Winckel

zur
Erlangung der Doctorwürde in Medicin, Chirurgie
und Geburtshilfe

vorgelegt von
Johannes Dahlem,
approbirtem Arzte aus Ibersheim (Rheinhessen).



MÜNCHEN.
Buchdruckerei von Julius Fuller, Färbergraben 7.
1886.

Ätiologie der Beckenendlage

Druckfehler:

- S. 5, Z. 6 v. o. fehlt ein Komma nach „entsprechend“.
S. 6, Z. 8 v. u. l. Lahs ft. Lachs.
S. 7, Z. 11 » » » aux » au.
S. 19 l. Kg ft. Ko.
S. 22, Z. 9 v. o. fehlt „den“ nach „in“.
S. 22, Z. 20 v. o. l. eben ft. oben.
S. 24, Z. 16 v. u. fehlt ein Komma nach „Weise“.
S. 27, Z. 10 v. u. l. heben ft. haben.
S. 35, Z. 8 v. o. l. einen » einem.
S. 35 Z. 7 v. u. streiche das Komma.
S. 62, Z. 11 muß x in Zähler und Nenner hoch stehen.

Andre Druckfehler und einige Inkonsequenzen bitte
ich den Leser selbst in Gedanken zu verbessern.

Erlangung der Doktorwürde in Medizin, Philosophie
und Geschichte

Johannes Dahlem,

assistent Arzt am Deutschen (Krankenhaus)

Die

Ätiologie der Beckenendlage

mit Beziehung auf die

in den letzten 2 $\frac{1}{2}$ Jahren in der Frauenklinik zu München
vorgekommenen Beckenendlagen.

Inaugural-Dissertation

verfasst und der

hohen medicinischen Facultät der Ludwig-Maximilians-
Universität

unter dem Präsidium des

Herrn Geheimraths Professor Dr. F. Winckel

zur

Erlangung der Doctorwürde in Medicin, Chirurgie
und Geburtshilfe

vorgelegt von

Johannes Dahlem,

approbirtem Arzte aus Ibersheim (Rheinhessen).



MÜNCHEN

Buchdruckerei von Julius Fuller, Färbergraben 7,

1886.

Seinen lieben Eltern

zur Feier ihrer silbernen Hochzeit

am 30. Januar 1887

in kindlicher Ehrfurcht

Der Verfasser.

Noch immer besteht betreffs der Urfachen der Kindeslagen keine Übereinstimmung in den Anschauungen, noch immer behauptet der „hippokratische Urbegriff“, wie COHNSTEIN sagte — ich möchte ihn lieber nach ARISTOTELES benennen —, die „Gravitationstheorie“, ein großes Terrain, nur natürlich in, der andren Zeit entsprechend andrer Gewandung, trotzdem SIMPSONS' klassischer Aufsatz schon vor mehr als einem Menschenalter erschienen. Freilich, die Diskussion über das Thema, und speciell „über die Urfache der normalen Kindeslage“ ist, nachdem sie während der Zeit, die der Geburtskunde das Wissen vom Lagewechsel eroberte, natürlicherweise noch lebhaft war, wieder verstummt im Gebiet der deutschen Zunge; und nur aus den verschiedenen Lehrbüchern kann man sich noch von der fortdauernden Verschiedenheit in den Ansichten der maafsgebenden Gröfsen der letzten Jahre überzeugen, wenn man nicht selbst die Gelegenheit hatte, der in Ausdruck und Wirkung sicher mannichfach davon verschiedenen Verbreitung der einzelnen Lehren in den Hörsälen beizuwohnen.

Hier eine kleine Probe, mit besonderer Rücksicht auf die Schwerkraft:

Über COHNSTEINS Theorie¹⁾ herrscht allerdings völlige Einhelligkeit; man führt sie, wenn man glaubt, etwas vollständig fein zu müssen, als neueste Kuriosität an. COHNSTEIN mochte den Umstand, daß keine der beiden Theorien die

¹⁾ Monatschr. f. Geb. Bd. 31, S. 167 ff. 1868. ib., von S. 141 an, eine Geschichte dieser Theorien.

andre völlig verdrängen gekonnt, als Beweis nehmen, daß keiner die siegende Kraft der Wahrheit inne wohne, daß keine Wahrheit sei. Er überzeugte Jeden — von dem Unrecht des Andern allein.

SCHRÖDER ¹⁾ beschuldigt noch ausschliesslich die Schwere als Urfache der Lage der Frucht mit dem Kopf nach unten; der Uterus hat nur den durch die Wirkung jener Kraft etwas abgewichenen Kopf auf den Beckeneingang zu stellen und dort zu erhalten in jenen Lagen der Mutter, die der richtenden Wirkung der Schwerkraft nicht so günstig sind.

SPIEGELBERG ²⁾ hielt die Schwerkraft, trotz mancher Bedenken, für „doch gewiss eine der wesentlichsten“,

BRAUN ³⁾ für „nicht die einzige Urfache dieses Räthfels“,

KLEINWÄCHTER ⁴⁾ glaubt, obgleich er sich hauptsächlich an SPIEGELBERG anlehnt, und einen grossen Theil der Auseinandersetzung von diesem wörtlich entlehnt, gar nicht an die Wirkung der Schwere, nicht einmal beim Positionswechsel, und ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich von den übrigen annehme, daß sie gleichfalls nicht weit von dieser Ansicht entfernt sind, wenn sie auch, wie SCANZONI, B. S. SCHULTZE u. a. früher die Schwere als wichtigen Faktor berücksichtigen mochten.

Was sie positives an Stelle des Ausfalls gesetzt haben, ist etwa das:

Alle drei betonen zuerst die Wichtigkeit des Verhältnisses zwischen Uterin- und Fötalform; BRAUN dann die Reflexbewegungen des Kindes, mit dem Beifügen, daß er nur den Lage- und Stellungswechsel lebender Kinder bestätigt finde;

SPIEGELBERG „das höhere spezifische Gewicht, welches der Kopf, nachdem er eine Zeit lang vorgelegen, gewonnen (Lachs), den Druck der Uterinwand, besonders der sich kontrahirenden (die Formrestitutionskraft), die dadurch erzeugten Reflexbewegungen.“

¹⁾ Lehrb. d. G., VII Aufl. 82, S. 69 ff.

²⁾ Lehrb. d. G., 78, S. 91 ff.

³⁾ Lehrb. d. gef. Gyn., II Aufl. 81, S. 20.

⁴⁾ Grundr. d. G., II Aufl. 81. S. 44 f. u. Eulenburgs Realencyklopädie, 81, unter „Kindeslage“.

KLEINWÄCHTER glaubt noch an einen Willen des Fötus und davon beherrschte Bewegungen.

Von neueren Lehrern fremder Zunge versucht LUSK¹⁾ den Widerspruch der Theorien so zu lösen: „Now, each one of these conflicting ideas undoubtedly represents a portion of, but not all, the truth“; wir müssen sie nur nach ihrem relativen Werthe sondern. Und da legt er denn der Schwerkraft nur nebensächliche Bedeutung bei, sie bewirke in der ersten Zeit der Schwangerschaft eine tiefere Lage des Kopfes als des Steißendes, bei Mehrgebärenden folge ihr das Kind auch später und lege sich schief, die Positionswechsel würden überhaupt durch sie hervorgebracht, während das eigentliche Korrektiv für abnorme Lagen der Druck der Uterinwände und die Reflexbewegungen des Kindes (nach SIMPSON) bilden, welche letztere wieder oft Uteruskontraktionen hervorrufen; bis die bequemste Lage gefunden.

Die meisten französischen Geburtshelfer stellen nach CHARPENTIER²⁾ Zeugnis, wie auch dieser selbst, die Anpassung des Fötus an die „ovoide“ Uterinhöhle in erste Linie; von der Schwere redet man nicht weiter. Während nun TARNIER und CHANTREUIL auf DUBOIS und SIMPSON zurückkommen, glaubt er selbst mit vielen andern an die Formulierung von PAJOT: „Quand un corps solide est contenu dans un autre, si le contenant est le siège d'alternatives de mouvements et de repos, si les surfaces sont glissantes et peu anguleuses, le contenu tendra sans cesse à accommoder sa forme et ses dimensions, au formes et à la capacité du contenant.“

Was nun die Beckenendlagen betrifft, mit denen ich mich speciell werde zu beschäftigen haben, so gehen die Meisten über die Ursachen derselben kurz hinweg, wenn auch vorher, bei der allgemeinen Erörterung, nicht bemerkt war, daß die „Ursachen der Kopflage“ nur das Überwiegen derselben bedingen sollten, und nicht etwa diese immer herstellen müßten.

SIMPSON³⁾ führt als ursächliche Momente für abnorme

¹⁾ The Science and Art of Midwifery, III Ed., 85, p. 81 ff.

²⁾ Traité pratique des accouchements, 79, T. I, p. 234 ff.

³⁾ The monthly L., v. IX, 48/49, p. 874 ff.

Lagen an: 1. Frühgeburt. 2. Tod. 3. Fötalleiden, besonders Wasserkopf. 4. Mißgeburt (doppelte). 5. Zwillinge 6. Hydramnion. 7. Krampfartige Uterinkontraktionen. 8. Organische Fehler der Uterinwände (Geschwülste). 9. Placenta praevia. 10) Beckenenge. 11) Unregelmäßige Uterusform. 12) Mechanische und zufällige Einwirkungen.

SCANZONI¹⁾ sagte noch vor zwanzig Jahren nichts weiter als: „Die Entstehung der Beckenendlagen dürfte am ungezwungensten aus der Umwandlung der Quer- und Schiefslagen in vertikale, bei denen das untere Rumpfsende in den unteren Gebärmutterabschnitt eintritt, zu erklären sein“; er habe oft in den letzten Wochen Querlagen getroffen, besonders bei solchen, die dann in Beckenendlage gebären, und sie seien bei Mehrgeschwängerten häufiger der nachgiebigen Uteruswände wegen, auch bei Tod der Frucht oft beobachtet.

SCHRÖDER²⁾ erklärt sie bei macerirten Früchten nach VEIT u. a. aus der Verrückung des Schwerpunkts, bei nicht macerirten verlangt er eine Lage der Frau, die den Fundus uteri zu dessen tiefstem Punkte mache, als Vorbedingung. Nur schade, daß Niemand, auch SCHRÖDER nicht, bei seinen Untersuchungen über Lagewechsel die einer Steißlage einer Frucht mit normaler Schwerpunktslage jedesmal nothwendig vorausgegangene Bauch-Seitenlage der Mutter und die der Bauchlage jedesmal, wenn das Kind überhaupt beweglich war, ebenso nothwendig folgende Steißlage ausdrücklich als beobachtet hervorgehoben hat. SCHRÖDER zieht sich allerdings durch unauffällige beiläufige Erwähnung der Kindsbewegungen etwas aus der Klemme: „daß sie nicht selten auch durch aktive Fruchtbewegungen entstehen, ist damit nicht negirt, und daß dies gelegentlich auch unter sehr ungünstigen Verhältnissen vorkommt, beweist z. B. der interessante von P. MÜLLER mitgetheilte Fall, in dem“ etc. — das ist alles!

Aber daß er auch noch in seiner neuesten Auflage dies kleine Zugeständniß nicht wenigstens etwas erweitert, müßte man ihm übel nehmen, wenn man annehmen könnte, daß er

¹⁾ Lehrb. d. G., IV Aufl., 67, Bd. I, S. 286.

²⁾ l. c. S. 71.

die Mufse hätte, alles bis auf diese dem praktischen Geburtshelfer noch ziemlich gleichgültige Frage selbst revidiren zu können — ziemlich gleichgültig, ganz nicht, denn nach SCHRÖDERS und anderer Ausführungen müßte man z. B. zu der Idee verführt werden, durch bestimmte Lagerung der Schwangeren die Lage des Kindes zur Geburt beeinflussen zu können, während diese Möglichkeit ganz wo anders liegt (normaliter). Doch nein, wir können, wie auch SCHIRÖDER in einem andern Theil seines Buches ¹⁾ selbst sagt, mit Hülfe der Schwerkraft ohne weitere Eingriffe Schief lagen noch nach dem Blafenprung gerade richten, aber gerade in der Art, daß wir die Frau auf die Seite legen, nach der der Kopf abgewichen; die Schwere macht hier den Fundus tiefer sinken in der nachgiebigen Bauchwand, und verändert die Richtung der Druckresultanten zum Beckeneingang. Ein denkender Schüler müßte nach dem Kapitel über die Kindeslage, besonders bei einigermaßen straffen Bauchdecken, das Gegentheil anordnen.

Von den übrigen oben angeführten Lehrern deutscher Zunge spricht SPIEGELBERG, wie mir scheint, am besten den Sinn der gemeinfamen Anschauung aus, indem er sagt, ²⁾ daß die Geburten in Beckenendlagen eine Folge des Fehlens der Momente sind, welche die Kopflage und deren Fixation bedingen. KLEINWÄCHTER sagt ³⁾ die Ursache sei eine größere Beweglichkeit der Frucht, BRAUN: ⁴⁾ die Verschiebbarkeit und Wandelbarkeit der Fruchtlagen und mehrfache zufällige mechanische Einflüsse.

Als Umstände, unter denen jene Lagen häufiger sind, zählen sie speciell auf (indem der eine wohl das oder jenes als unwichtig nicht eigens nennt): schlaffe Uterinwände, vermehrtes Fruchtwasser, Kleinheit und Tod der Frucht, mehrfache Geburt, Placenta praevia, welche Momente bei Mehrgebärenden öfter getroffen werden.

BRAUN erwähnt eine vermehrte „Beweglichkeit der Frucht“, worunter er vermehrte aktive Bewegungen zu verstehen scheint, und KLEINWÄCHTER bringt noch ein sonderbares Moment dazu, wenn nämlich die Nabelschnur sehr lang sei,

1) l. c. S. 642. 2) 171. 3) 128. 4) 186.

und das fogar „nicht fo felten“. Umfchlingungen hatte auch Herr Geheimerath WINCKEL¹⁾ in einzelnen Fällen als denkbare Urfache angeprochen, und eine gröfsere Häufigkeit derfelben bei Beckenendlagen gefunden.

LUSK²⁾ drückt fich fast ebenfo wie SPIEGELBERG aus, und erwähnt noch Beckenenge.

CHARPENTIER³⁾ fügt als vollftändigfter (von SIMPSON abgesehen) den erwähnten Momenten noch zu: Uterusgefchwülste, falſche Placentarinſertion, Hydrocephalus, auch vorzeitigen Eihautriß; der Fötus wird dann in Beckenendlage geboren, wenn der vorher bewegliche und gerade in einer folchen Lage fich befindende, fo durch den fich verkleinernden Uterus überaſcht und fixirt wird (nach DUNCAN⁴⁾). Dieſe Fixation kann, fo ſcheint er ſich vorzuſtellen, ebenſowohl lange vor der Geburt, als erſt während derfelben geſchehen, das letztere z. B. auch, normaler Weiſe, bei Frühgeburten vor Ende des 7. oder 6. Monats. Hierbei muß ich, um die Anſchauung des Franzoſen klarer zu ſtellen, der PINARD'schen Eintheilung⁵⁾ der *présentations du ſiège in franches* und *accidentelles* oder *fortuites* gedenken, die erſteren ſelten und nur bei Erſtgebärenden, wozu BUDIN⁶⁾ bemerkt, daſs wenigſtens bei einem Theile dieſer das kindliche Becken während der letzten Tage und Wochen fogar feſt im mütterlichen ſtehe.

In der Hauptſache wurde alſo folgendes aufgeführt: ein negatives räumliches Mißverhältniß zwifchen dem Kind und ſeinem Behälter, vermehrte oder verſtärkte Kindsbewegungen, und im Gegentheil auch völliges Erlöſchen derfelben und Veränderung in der Beſchaffenheit des Kindes durch den Tod, hinwiederum auch Erſchlaffung der Uteruswände, aus verſchiedenen Urfachen.

Über die einzelnen Arten von Beckenendlage finde ich unter den angezogenen Autoren nur bei KLEINWÄCHTER die

1) Ber. u. Stud. I 1874, S. 663. 2) l. c. 203 f. 3) 250. 4) Edinb. med. a. surg. I. 1855. p. 59.

5) *Traité du palper abdominal*, 78, p. 37. f.

6) *Progrés med.* VI. 81, p. 515 ff u. in *Obstétr. et Gyn., rech. etc.* 85, p. 409 ff.

Bemerkung, daß der Steifs nicht leicht ins Becken sinke, bei Beginn der Wehen am Rande hängen bleiben, und die Füße vorangetrieben werden können; und BUDIN zitiert HUBERT und FRITSCH, daß es primär nur „Beckenendlagen“ gebe, während Steifs-, Fuß- und Knielagen sekundär, bei Beginn der Wehen entstanden seien, und daß die erste bei Mehrgeläbenden häufiger seien, wogegen BUDIN aber primäre Steifslagen konstatieren will, indem er sich zugleich auf PINARD beruft.

Aus dieser kleinen Zusammenstellung geht, meine ich, schon zur Genüge hervor, daß allerdings SCHRÖDER mit der Heranziehung der Schwerkraft zur Erklärung der Beckenendlage ziemlich allein dasteht; aber die eine Ausnahme hat solches Gewicht, in Deutschland hat der Name SCHRÖDER eine solche Bedeutung, seinen Worten lauscht eine solche Menge von Gläubigen, und für die Erklärung der normalen Kindslage erfreut sich die „Schwerkraftstheorie“ noch eines so ungehörlichen weiteren Ansehens, daß ich mich nicht enthalten kann, auf sie ein wenig näher einzugehen.

Dieser unglückselige Zufall, daß die Schwerkraft, wenn man ihr eine Wirkung zugestehen könnte, ebenfalls die Kopflagen zu den häufigsten machen würde, wie es scheint, denn auch das steht nicht über jeden Einwand erhaben da! Darauf beruht nun aber die ganze Beweisführung: weil bei Schwimmversuchen in einer Flüssigkeit von dem Fötus gleichen spec. Gewicht der Kopf tiefer liegt wie der Steifs, ebenso wie der Muttermund an der tiefsten Stelle der Uterinhöhle liegt, muß die Schwere den Kopf über den Muttermund bringen! Zum mindesten sucht SCHRÖDER nicht mehr zu beweisen.

Auch sonst sind der Schwerkraft von Geburtkundigen manche Sünden zugeschoben worden, an denen sie unschuldig sein dürfte: sie soll Ursache des tiefen Sitzes der Placenta sein (auch nach SCHRÖDER). Erstlich aber weiß man nicht, ob das Eichen ein größeres spezifisches Gewicht hat als der Uterusschleim, dann aber kommt es auch bei der Zähigkeit des Schleims auf das absolute Gewicht des Eies an, das sich durcharbeiten soll: schwimmt ja doch selbst Eisen auf gewöhn-

lichem Wasser, wie sich jeder mit gebrauchten Näh- oder selbst Stecknadeln überzeugen kann, die doch auch viel gröfser als das Ei sind, und auf die Lage des nicht vergrösserten Uterus. Wenn übrigens das eben befruchtete Ei bis zum Muttermund „heruntersinken“¹⁾ kann, wird ihm dieser wohl auch nicht zu enge sein, und wenn einmal ein Abort durch die Wirkung der Schwere geschieht (denn was wäre das anders?): wohin sollen wir da noch kommen, nachdem die Lehre vom Sichselbstgebären doch schon unter'm Staub der Jahrhunderte schlummert. Auf Ballotement und Bildung des unteren Uterinsegments komme ich später.

Leider liegt die Sache nicht so einfach (finden wir ja doch überhaupt in der organisirten Welt, ja schon in den organischen Verbindungen fast überall recht complicirte Verhältnisse), dafs man sich das Kind als von der Anziehungskraft der Erde in immer derselben Stellung zum Erdradius erhalten vorstellen dürfte; während die Lageveränderungen des Kindes, die wir ja mit Beziehung auf die Geburtstheile der Mutter bezeichnen, durch veränderte Stellung dieser Theile (mit der Mutter) zum Erdradius entstünden, gleichsam durch Drehung der Mutter um das Kind, das sich, immer in derselben Lage — auf die Mutter Erde bezogen — nur mehr oder weniger vom Anziehungsmittelpunkt entfernte, so dafs man mit Bezug auf die Außenwelt richtiger von Mutter- als von Kindslageänderungen spräche! Seit Bekanntwerden des Lagewechsels ist nun auch die Vertheidigung der Schwerkraft als Ursache um ein bedeutendes schwerer geworden.

Allerdings könnte man in andrer Hinsicht an eine ätiologische Bedeutung der Schwere für die Kindsbewegungen denken: durch die gegenüber der vorher, in den ersten Monaten des intrauterinen Lebens (und nachher, im Anfang des extrauterinen) fortdauernd eingenommenen mehr horizontalen Lage veränderte Blutvertheilung könnte der Anstofs zum Verlassen der Längslage in immer derselben Richtung gegeben werden. Der Fötus erleidet allerdings an seiner tiefsten Stelle auch den grössten Druck von aussen, aber wenn dieser auch

¹⁾ Schröder l. c. S. 683.

vielleicht so stark werden könnte, daß er eine vermehrte Gefäßfüllung in den tiefliegenden Theilen des Fötus auf Kosten der höherliegenden nicht gestattet, so würde der Druck dem Fötus jedenfalls nur noch unbequemer und veranlaßte ihn erst recht, zu zappeln, allerdings nicht auf dem Weg des Willens (fogar bei Neugeborenen sind ja nach SOLTSMANN noch Reizungen der motorischen Hirnrindencentra ohnè Erfolg). Damit haben wir vielleicht eine Ursache des Lagewechsels. Wenn aber gemäß SPIEGELBERGS Meinung ¹⁾ das spezifische Gewicht des tiefer liegenden Kopfes so erhöht werden kann, ist das doch jedenfalls gleichgültig; auch ob die Kindsbewegungen an sich, oder durch Erregung von Uteruskontraktionen die Lage ändern. Der Mensch hat ja immer einen nicht ganz unähnlichen Wechsel zwischen Stehen und Liegen nöthig, wenn er nicht fortdauernd liegt, und MEULI-HILTY verlangt fogar jetzt für das extra-uterine Leben einen ganz gleichen Wechsel, indem er Tieflage des Kopfes im Schlaf für das natürliche hält. — Ich rede selbstverständlich nur von Lage und Lagewechsel während der letzten Schwangerschaftsmonate.

Schon a priori argumentirt recht schön KRISTELLER ²⁾, hat die Anziehungskraft der Erde als ursächliches Moment wenig Aussicht auf Anerkennung: der Organismus ist auch da wo ihm die Schwere nützlich sein könnte, nicht auf sie angewiesen, so bei Bewegung der Speisen und ihrer Reste vom Mund bis zum After, bei der Entfernung der Nierenauscheidung etc. Wenn das auch unter normalen Verhältnissen die Schwerkraft beforgen könnte, sind doch Vorrichtungen getroffen, daß all das, auch wenn wir uns auf den Kopf stellen, normal vor sich geht. Die Herstellung der normalen Kindeslage ist eine physiologische Thätigkeit (vital action: SIMPSON ³⁾), wie diese alle, wie die Geburt selbst, die ja auch in den meisten Lagen der Mutter die Schwere vollziehen könnte, wären die Wege leicht genug gangbar; und die Natur hat den Menschen, wie gegen die schädlichen Ein-

¹⁾ I. c. — Allenfalls kann man das mit Meeh (Archiv f. G. XX, 191) zur Erklärung der Schwimmrichtung verwerthen.

²⁾ M. f. G. Bd. V, S. 411. ³⁾ I. c. S. 432.

flüsse anderer physikalischer Kräfte, besonders mechanischer und thermischer, auch gegen unwillkommene Einmischung der Schwerkraft geschützt.

Wären die ersten Frauen alle mit so hochgradigem Hydramnion zur Entbindung gekommen, daß der völlig kugelige Uterus den Fötus in jeder Stellung an die tiefste Stelle gleiten ließe, — nach etlichen Generationen wäre das neue Geschlecht sicher von der Erde verschwunden gewesen, denn unter solchen Umständen hätte es fast nur Schiefslagen geben müssen, und ich glaube mit Recht zweifeln zu dürfen, ob die ersten Menschen sich dabei schon zu helfen gewußt hätten!

Warum hat denn die Schwerkraft dann nicht auch das Menschengeschlecht gezwungen, auf den Händen, oder doch wenigstens auf allen Vieren zu gehen, wo ja auch, da der Schwerpunkt tiefer liegt, die Balance leichter? Und so wäre noch gar viel zu fragen...

Wie mögen denn weiter die Anhänger dieser Theorie einen so gekünstelten Unterschied zwischen Mensch und Thier stellen: bei Thierföten, behaupten sie,¹⁾ allerdings auf Anstiften ihres alten Gegners DUBOIS²⁾, läge der (spec.) Schwerpunkt dem Steifs näher. Ich wäre begierig, zu erfahren, wie denn die Fanatiker jener Theorie sich die Verhältnisse bei unsern nächsten Verwandten im Thierreich, bei den verschiedenen Affenarten denken? Der „Schwerpunkt“, wie BATTLEHNER sagt, liegt übrigens nach KEHRERS³⁾ Versuchen bei den Thieren ebenso wie beim Menschen.

Ohne im geringsten die Verdienste jener Männer um die Geburtskunde herabsetzen zu wollen (wie vermöcht' ich das!), kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken: es scheint mir, daß sie hier auf einem ihrem gewohnten Schaffensgebiet zu weit abliegenden Felde arbeiteten, im Gebiete der Physik, speziell der Mechanik gar, und daß ihre Arbeit drum da keine gefunden Früchte zeitigen konnte. Ein böser Zufall hat viel kostbare Arbeitskraft vergeudet werden lassen! SCHRÖDER

¹⁾ Battlehner, M. f. G. Bd. 4, 1854, S. 435; Schröder l. c. S. 128.

²⁾ Mém. de l'acad. roy. 1833, T. II, p. 273.

³⁾ Beitr. z. G. 1867, Heft 2, S. 103 ff

beruft sich auf BATTLEHNER u. DUNCAN: Diefе beiden hätten die Einwände gegen Anrufung der Schwerkraft längft zurückgewiefen. Darf man nun, frage ich, von einem Manne die Widerlegung von Einwänden gegen Hereinziehung einer Kraft verlangen, dem es paffiren kann, den Angriffspunkt eben diefer Kraft (refp. der Refultanten der Wirkungen diefer Kraft auf die einzelnen Theile des betreffenden Körpers), den Schwerpunkt, zu definiren als „den Punkt, der, wenn er allein unterftützt wird, das ganze Gewicht jedes einzelnen Theiles zu tragen hat“. Wollte BATTLEHNER einfach und klar fein, fo durfte er das doch nicht auf Koften der Wahrheit oder beffer Genauigkeit, befonders in einem Auffatz aus dem Gebiet der exakteften der Naturwiffenfchaften. „Wenn ein Körper durch Unterftützung feines Schwerpunktes in Ruhe bleibt, befindet er fich im Gleichgewicht,“ und da werden blofs 2 Arten, ftabiles und labiles, erwähnt. Das hat BATTLEHNER im Jahre 64 gefchrieben.¹⁾ Bei DUNCAN allerdings, als fo ziemlich dem einzigen von den Vertheidigern der Gravitationstheorie (foweit ich fie kenne), laffen fich folche Ungenauigkeiten nicht nachweifен. Und gerade er überliefs einen Theil der phyfikalifchen Arbeiten anderen Händen: die Beftimmungen des fpec. Gewichts rühren nicht von ihm. Er hat fogar, auch meiner Einficht nach, fpätere Einwände SCANZONIS fchon widerlegt, wie SCHRÖDER will, und er hätte mich gewifs am eheften von der Wirkung der Schwerkraft zu überzeugen vermocht (es ftammen alfo überhaupt aus dem Sprach- und Denkgebiet, in dem unfer vornehmftes Instrument, der mangelnden Kraft des Uterus interpartum zu Hülfe zu kommen, die Zange, erfonnen ward, auch die beften Ideen zur Lage des Kindes) vor Entdeckung des Lagewechsels (diefeß Refultate deutfcher Wiffenfchaft). Diefes aber hat zum Theil fchon ohne Weiteres DUNCAN widerlegt. Wie fich DUNCAN in feinem fpäteren Auffatz dazu ftellt, zur Zeit der Unterfuchungen über den Lagewechsel, weifs ich leider nicht.

Mein Urtheil über DUNCAN war nicht immer diefes, wie ich es nun ausfprechen mußte; ich hatte zuerft nur den von

¹⁾ l. c, S. 423.

SCHRÖDER als Reproduktion empfohlenen Aufsatz von HELFFT¹⁾ und einige gelegentliche Bemerkungen Anderer gelesen und muß DUNCAN Abbitte leisten für die schlechte Meinung, die ich von seinem physikalischen Können hatte, — eine Folge einer so weitgehenden Unbekanntschaft der Referenten mit dem physikalischen Theil ihres Stoffes, daß sie nicht einmal richtig überetzten. HELFFTS Arbeit ist fast nur eine, in der That größtentheils sehr gute, theilweise Uebersetzung DUNCANS, aber er erlaubt sich ganz unerlaubte Freiheiten, z. B. „dadurch, daß er (der Uterus) eine schiefe Stellung hat, drückt die Flüssigkeit auf alle Theile der Wandung gleichmäÙig.“ Das ist erstens nicht wahr, selbst bei der stärksten Wehe, und zweitens sagt das DUNCAN nicht, sondern die Druckhöhe der Flüssigkeit wird geringer.

Die Reproduktion der Ausführungen DUNCANS über Hydrocephalus, wo er den fast unbegreiflichen Fehler SIMPSONS verbessert, ist zwar auch bei HELFFT nicht ganz einwandfrei, doch aber freier als die HÖNINGS,²⁾ daß „die successive Zunahme des Wassers im Schädel den Schwerpunkt in demselben Maße vom Kopf entfernt.“ Abgesehen davon, daß statt „Wasser“ „Flüssigkeit“ stehen könnte, ist doch hoffentlich nicht der Schwerpunkt an sich gemeint, sondern der auf Fruchtwasser bezogene, der relative oder „specifische“, wie SCHATZ³⁾ ganz treffend sagt. Dann aber behauptet auch sogar DUNCAN nicht, daß die Zunahme der intracraniellen Flüssigkeit den specifischen Schwerpunkt vom Kopf entferne, sondern der Schwund des Gehirnes, und daß er dem Becken näher als dem Kopfe kommen könne, ist nur Vermuthung geblieben, so daß meine Behauptungen, die mit einer besseren Theorie im Einklang stehen, auch ohne Experimente besser erscheinen werden. Uebrigens scheint jener Versuch von DUNCAN, wobei ein enthaupteter Fötus mit dem Hals tiefer schwamm, — in Flüssigkeit von gleichem specifischen Gewicht freilich, — dafür zu sprechen, daß die Abnahme des Gehirns, die wir ja einer

¹⁾ M. f. G., Bd. 5. S. 265 ff. ²⁾ Scanzonis Beitr., Bd. 7, 1873, S. 104.

³⁾ Tagebl. d. Leipz. Naturforschervers. 1872. S. 175.

theilweisen Enthauptung gleichsetzen müssen, nicht soweit gehen kann, und solche Wirkung haben, als er glaubt (doch spricht auch wieder einiges für ihn). Die Flüssigkeit im Schädel wird immer annähernd dasselbe specifische Gewicht wie das Fruchtwasser haben; beides sind ja im Wesentlichen Bluttranssudate, wenn auch das eine von der Mutter, das andere vom Kind, und können sich noch dazu, wenn nicht von gleicher Beschaffenheit, langsam durch Diösmose durch das dünne Schädeldach mischen. DUNCANS eine Bestimmung beweist nichts, da er das specifische Gewicht des Fruchtwassers dabei nicht beachtete.

HÖNING freilich durfte an eine Abnahme des Gehirns als Ursache nicht denken, nachdem er gerade vorher einen gewaltigen Irrthum POPPELS¹⁾ als richtig anerkannt hatte, daß bei stärkerer Entwicklung des specifisch leichten Gehirns der specifische Schwerpunkt von diesem wegrücken müsse, und umgekehrt: Bei Schwimmversuchen ist das schon richtig, da das specifische Gewicht des Kindes und damit eben auch des Salzwassers, in dem es schwimmt, höher als das des Gehirnes ist, während aber meines Wissens noch nie das specifische Gewicht eines Fruchtwassers höher als das eines Gehirnes gefunden ist — womit POPPELS Meinung als falsch erwiesen. Die von ihm gefundenen Thatfachen können aber dennoch allgemein gültig sein und ich werde später noch darüber handeln; HÖNING stützt ebenfalls einen konkreten Fall mit POPPELS Theorie.

Uebrigens schreiben POPPEL und wie schon oben erwähnt BATTLEINER und manche Andere, wie HÖNING, „Schwerpunkt“ allein.

HELFFT meint ferner: der Kopf liegt unten, „denn dieser ist der schwerste Theil“, und eine ähnliche Ausdrucksweise findet sich bei verschiedenen Autoren, so, vom Hintertheil der Thiere, bei SCHRÖDER, so bei NÄGELE-GRENSER²⁾ (welches Lehrbuch in unsrer Frage in der mir vorliegenden Auflage ganz an SCANZONI glaubt), wo specifisch beigefügt ist: auch

¹⁾ M. f. G. Bd. 32, S. 321 ff. u. Bd. 33 S. 279 ff.

²⁾ Lehrb. d. G., VIII. Aufl. 1872, S. 77.

das ist nicht richtig, sondern es muß absolutes und specifisches Gewicht oder Volumen und eines der beiden berücksichtigt werden, wie auch SCHATZ gegen NEUGEBAUER bei der Diskussion über den Vortrag jenes betonte.

Was solche Einseitigkeiten bedeuten, will ich an einem Beispiel zu erklären mir erlauben: Denken wir uns eine Waage in Wasser vom spec. Gew. 1, und auf eine Schale 10 C.-cm. (nicht „gr.“, wie oft statt dessen zu hören) einer Substanz von sp. Gew. 1, 1; auf die andre 11 v. 1,09: so wird die Schale der ersten sinken (1,0 gegen 0,99); bei 1,091 aber die letztere; und im ersten Fall in der Luft umgekehrt. Auf der Seite der sinkenden Schale liegt aber der Schwerpunkt des Systems für das betreffende Medium, und damit ist denn auch zugleich bewiesen, daß das Medium, in dem die Bestimmungen gemacht werden, durchaus nicht gleichgiltig ist, daß der Schwerpunkt des Kindes im Fruchtwasser ganz wo anders liegen kann, wie in Salzwasser, in dem es schwimmt.

Von verschiedenen andren Sonderbarkeiten in dieser Litteratur werde ich noch zu reden haben, wenn ich auch nicht die Absicht habe, alle gefundenen Irrthümer zu verbessern. Und SCHRÖDER scheint all das zu übersehen!

Es hätten wenigstens bei solchen physikalischen Untersuchungen, wie sie die Schwimmversuche darstellen, nicht bloß die spec. Gewichte der bereiteten Flüssigkeiten, sondern auch der Fruchtwasser angegeben werden müssen etc., abgesehen davon, daß nur der Schwerpunkt in Fruchtwasser uns interessiert, den aber nur SCHATZ zu bestimmen versucht.

Ich habe mich vergebens umgesehen, eine Bemerkung über das specifische Gewicht des Neugeborenen, das wir ja mit dem der Flüssigkeit, in der er schwimmt, auch hätten, zu finden, die ich zur Basis einer kleinen Berechnung hätte machen können; außer bei DUNCAN, der aber wenig bekannt zu sein scheint, eine einzige Beobachtung, gegen die man indessen den Vorwurf erheben könnte, daß vielleicht ein ganz abnormes Kind verwandt worden sei, wie ja auch von einem Neapolitaner bekannt ist, daß er so viel specifisch leichter war als Wasser, daß seine Brust, wenn er sich frei hereinstellte,

noch drüber wegfah. HELFFT wagt auch nicht, den Versuch DUNCANS mitzutheilen.

Die SCHATZ'schen Untersuchungen, die einzigen, auch in dieser Hinsicht, exakten, die ihn, als er eben die früher als richtig angenommene Gravitationstheorie¹⁾ durch Bestimmungen des spec. Schwerpunkts und durch Beobachtung von Lagewechseln in Verbindung mit solchen der Mutter als richtig nachweisen wollte, zu ihrem Gegner machten, scheinen nicht recht anerkannt zu werden, so daß wir uns durch Rechnung noch einmal von ihrer Richtigkeit in diesem Theil überzeugen wollen.

So gehe ich denn vom Erwachsenen aus, und wähle einen 60 Ko. schweren Mann, der bei einem Luftgehalt der Lungen von 4 Liter eben im Wasser schwimmen soll, also jedenfalls specifisch nicht sehr leicht ist. (Da an eine ganz genaue Bestimmung nicht zu denken, vernachlässige ich auch Temperatur etc.). Jene Luft wiegt, da ihr spec. Gewicht 0,001293: 5,172 gr. oder 3994,8 gr weniger, als das gleiche Volum Wasser. Um ebensoviel müssen nun die 60 Ko. Menschenmasse mehr wiegen, als das von ihnen verdrängte Wasser, also 1 Ko. um 66 gr. mehr; mithin verdrängt 1 Ko. dieses Menschen 944 C.-cm. Wasser, das heißt 994 C.-cm. Mensch wiegen 1000 gr., oder 1 L. Mensch wiegt $\frac{1000}{944}$ 1,059 Ko, und unser Mensch hat ein spec. Gewicht von nicht einmal 1,06. Da aber, ganz abgesehen davon, daß wir einen specifisch ziemlich schweren Menschen der Rechnung unterlegten, ein Fötus noch viel leichter sein muß wegen des größeren Wasserreichthums seiner Gewebe und des geringen Gehaltes an Aschebestandtheilen, so wäre 1055 schon ein hohes spec. Gewicht — DUNCAN findet nahe 1050. Nehmen wir weiter für das Fruchtwasser 1015 an (nach SCHRÖDER 1002—1028.), so ergibt sich ein Mehr des Fötus, wenn wir einen solchen von 3000 C.-cm. annehmen (also über 3000 gr. schwer), von 3000 mal 0,040 gleich 120 gr. SCHATZ fand 100 bis 120. Die Berücksichtigung der Nabelschnur würde jedenfalls das Resultat nicht in der Richtung der Vermehrung des Übergewichtes

¹⁾ Geburtsmech. der Kopfendlagen 1868, S. 35—40 u. l. c.

ändern können, indem sie ebenso wie der Fötus den tiefsten Platz in der Höhle will.

Es braucht sich nun zunächst, bei so normalen Verhältnissen, Niemand den Kopf darüber zu zerbrechen, ob der Fötus schwimmt oder nicht, wie das Manche gethan, wir brauchen auch gar nicht vom Mediciner zu verlangen, daß er sich mit dem Archimedischen Princip und allem, was damit zusammenhängt, vertraut mache: Wir können uns ja einmal einfach vorstellen, daß der ganze Uterusinnenraum von gegen 4000 C.-cm. einer gleichmäßig festen Masse vom spec. Gewichte 1015 erfüllt sei, in der an einer Stelle ein Übergewicht von 100 gr. vorhanden sei. Von diesem Übergewicht abgesehen, entsprechen sich die bei den Drehungen auf- und absteigenden Gewichte ganz. Das ist also das „bedeutende Übergewicht“, von dem HÖNING bei seinem Beispiel spricht! Das sind unsere dunklen qualitativen Vorstellungen, sagt Herr Geheimerath PETTENKOFER bei Besprechung der Ventilation: Die kleinste Fensteröffnung in einem Lokal mit der schlechtesten Atmosphäre beruhigt jeden! Solches wiederholt sich so oft!

Auch KRISTELLER¹⁾ spricht eine ähnliche falsche Ansicht aus, und will doch einer von ihm als so bedeutend angenommenen Kraft die Leistung solcher Arbeit nicht zutrauen! HELFFT sagt ganz richtig nach DUNCAN: Der Fötus senkt sich mit einer fast nicht zu berechnenden Kraft zu Boden, und ich glaube in so ferne mit ihm, daß selbst 100 gr. für den absolut und specifisch schwersten Fötus im allgemeinen mehr wie genug sind. Von Schwimmen dagegen kann aber auch nie die Rede sein, wie SIMPSON unbegreiflicher Weise in seiner Figur aus der ersten Schwangerschaftshälfte es darstellt, und der sonst eine so gesunde Kritik übende M. DUNCAN ebenso unbegreiflich getreu kopirt; weder bei wenig, noch bei viel Fruchtwasser, und auch der nach oben gerichtete Theil wird nicht flottirend erhalten (SCANZONI), sondern muß sich aufstützen, oder kann, wenn's eine Extremität, hängen: Der Auftrieb erreicht nie die volle Größe des Gewichts des be-

¹⁾ l. c. S. 414.

treffenden Körpertheils — normaler Weise! Das Ballotement aber als Beweis des höheren specifischen Gewichtes zu nehmen, wie DUNCAN zuerst that, hat seine Bedenken: Wenn das andere Kindesende bei dem Stofs die gegenüberliegende Wand der Höhle berührt, wird jedenfalls der Rückstofs theilweise durch Zusammenkrümmung des elastischen Fötalrumpfes zwischen Finger und gegenüberliegender Uteruswand, und durch den elastischen Widerstand dieser bewirkt; und im Fundus doch jedenfalls nur durch diese zwei allein. Wer vermag zu begreifen, wie es SCHRÖDER wagen kann, ein solches Ballotement zuzugestehen, nachdem er daselbe wenige Seiten vorher¹⁾ als ein „sich herabsenken“ definiert hatte? Dafs nur ein so geringer Kraftaufwand des untersuchenden Fingers zur Hervorrufung dieses Stosses nöthig ist, ist natürlich kein Gegengrund gegen meine Erklärung: Die Elasticität der Theile ist eben klein!

Das beiläufig; nachdem wir nun also gesehen, dafs wir uns im spec. Schwerpunkt nur wenige, bis zu 100 und einige mehr, Gramm wirkend denken können, kommt es noch auf die Lage dieses Punktes an — derselbe kann, wie gesagt, auch auf der Seite von Theilen mit geringerem absolut. oder spec. Gewicht liegen — und diesen stellt sich wohl HELFFT als sehr excentrisch gelegen vor, denn läge er in der Mitte zwischen Kopf- und Beckenende, so würde offenbar durch die Anziehungskraft der Erde gar keine Umlagerung des Kindes entstehen können; da der Schwerpunkt der verdrängten Flüssigkeitsmasse, unter welchen, wie DUNCAN ganz richtig sagt, die Schwere jenen andern Punkt in senkrechter Richtung zu stellen sucht, auch dort liegt. Denn ist das Kopfende auch schmaler, so ist doch das Beckenende nur breiter durch Zusammenlegen kleiner Theile, die Lücken zwischen sich lassen, also sein Volum wohl nicht gröfser wie das des Schädeldes, wenigstens nicht viel. (Anders liegen die Verhältnisse beim Hydrocephalus, und hieraus wäre eine, freilich sehr schwache Stütze der Gravitationstheorie vielleicht zu machen gewesen, hätten die übrigen Behauptungen jener Herren als richtig sich durchaus erwiesen). Liegen aber beide Punkte nahe bei einander,

¹⁾ l. c. S. 129 u. 114.

so kann Bewegung durch die Schwere nur bei ganz minimalen Widerständen erfolgen, denn diese wirken ja an der Peripherie des zu bewegendes Körpers, an einem viel längeren Hebelarm, so daß sie vielmals kleiner, als die Anziehungskraft der 100 gr. gegen den Erdmittelpunkt sein können. Und diese ist doch an sich schon recht gering, so daß man das Kind unter normalen Verhältnissen fast als in indifferentem Gleichgewicht befindlich betrachten könnte, wenn es nicht der Uterus immer in stabilem hielt, selbst auch in einzelnen Phasen der Lageänderungen, trotz POPPEL¹⁾ und COHNSTEIN²⁾: Dieser las daselbe auch aus jenes Ausführungen heraus und bezeichnete es als falsch, während sich der Angegriffene ganz energisch gegen solche Beschuldigung verwahrte, indem er die merkwürdige Ansicht zu Tage brachte, daß man von Gleichgewicht nur reden könne, wenn der Schwerpunkt in einem Punkt unterstützt sei, und daß sonach der Fötus, wenn überhaupt im Gleichgewicht, im labilen sei, was er aber nicht zugeben will (!!). Daß nun also der spezifische Schwerpunkt einen beachtenswerth kleineren Abstand vom Scheitel habe als vom Steiß, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil das oben schwimmende Kind schräg (30° DUNCAN) mit dem Kopf nach unten liegt; der Schwerpunkt der von ihm, in intrauteriner Haltung, verdrängten Wassermasse liegt nun jedenfalls nahe an der Bauchfläche, wohl noch innerhalb des Kindes, der Schwerpunkt des Kindes aber in der betreffenden Flüssigkeit liegt jedenfalls wenigstens nicht ganz an der Rückenfläche, und da dieser nun senkrecht unter dem andern liegt, die Bauchfläche aber nach unten hin sich schnell von der Senkrechten entfernt, die Rückfläche diese bald schneidet, und außerdem auch nach POPPEL in der Luft der Schwerpunkt der Mitte nahe liegt, dürfte gegen meine Behauptung nicht viel einzuwenden sein. Denn zwischen beiden muß sich doch wohl der Schwerpunkt in Flüssigkeiten, deren spec. Gewicht zwischen denen der zwei benützten Medien liegt, befinden. KEHRER³⁾ fand aber sogar den Schwerpunkt (in Luft) dem Steiß näher (POPPEL nur bei

1) l. c. I. c. 2) M. f. G. Bd. 32 S. 340 f.

3) l. c. 109 f.

einem Theil der Fälle), welches Verhältniß sich aber freilich schon bei einigen Versuchen in Wasser umzukehren schien. Aber selbst da, wo doch das bewegende Übergewicht sehr groß, mußte er den Glastrichter, in dem der Fötus lag, der hier doch wenig Widerstand fand, noch schütteln, wobei mehr Kopflagen entstanden.

Aber SCHATZ fand, daß der Fötus im Fruchtwasser in einem trichterförmigen Raum mit dem Becken sich tiefer stelle. Und der Fötus liegt doch im Uterus weder in Luft, noch in Flüssigkeit von 1 oder 1,05 spec. Gewicht, und SCHRÖDER übergeht gerade diese in erster Linie berücksichtigenswerthen Versuche, gerade den Untersucher, der in physikalischer und medicinischer Hinsicht die Frage am exactesten behandelte, mit Schweigen.

So ist man nun doch gewiß nicht berechtigt, anzunehmen, daß der Schwerpunkt im Fruchtwasser in einer solchen Mehrzahl von Fällen dem Kopf mehr oder weniger näher liege, als die Kopf- über die Beckenendlagen vorherrschen; auch mit Hülfe der Bauch-Seitenlage wird die Theorie schon da nicht mehr zu halten sein. Geben wir aber zu, der spec. Schwerpunkt läge immer dem Scheitel näher, ja sogar um 5 cm., also 10 vom Scheitel, 15 vom Steiß bei einem Kind der letzten Monate, denn seit Entdeckung des Lagewechsels handelt es sich ja immer nur um die Lage der Verhältnisse während der letzten Zeit vor der Geburt, und Frühgeburten berücksichtige ich hier nicht.

Also an jenem Punkt greifen 100 gr. an, macht für das Scheitelende 20 gr., um die Bewegungskraft an gleichem Hebelarm angreifen zu lassen, wie die peripheren Widerstände. Diese Rechnung entspricht etwa einer Zeichnung von DUNCAN (Fig. 10; das »Centre of Buoyancy« verlegt auch er in die Mitte), während SCHATZ 10 gr. für das Steißende findet. Diese außerordentlich kleine Kraft muß noch nach dem Satz vom Parallelogramm der Kräfte zerlegt werden, wie schon KRISTELLER andeutet, da sie ja für gewöhnlich nicht senkrecht zur Wand wirkt, und es müssen von ihr 3000—4000 gr., die sich überall, im ganzen Umfange, an den, wenn auch glatten Wänden reiben,

gedreht werden (eigentlich reiben sich Fötus, Nabelschnur, Fruchtwasser, Uterus gegenseitig). Dazu müssen noch die Uterinwände um ein beträchtliches ausgebuchtet werden, wo Kopf und Steiß vorbeigehen: das gibt relativ ungeheuer große Werthe für Reibung; und wo sind denn die Kräfte, die dem aufsteigenden Steiß die Reibung überwinden helfen: wenn er tiefer als der Kopf liegt, so drückt am Kopfe zwar ein kleines Übergewicht des Kindes, am Steißende aber eine höhere Flüssigkeitsäule. Und der Uterus antwortet doch oft auf mechanische Einbuchtungen mit Kontractionen: wäre das auch bei Ausbuchtungen der Fall, so würde der Kopf zum wenigsten nicht tiefer kommen. Kindsbewegungen hingegen könnten durch von ihnen hervorgerufene Wehen erst zur Ursache von Lageänderungen werden: die Füße machen eine ihrer gewöhnlichen stoßenden Bewegungen, der ausgebuchtete Uterustheil contrahirt sich und so gibt er dem Stoß erst recht eine auf das Kind, resp. zunächst dessen Beckenende rückwirkende Kraft.

Allerdings ist der Widerstand in den zur Scheitel-Steiß-Linie senkrechten Ebenen kleiner, greift nicht so peripher an.

Wer es nun immer noch nicht begreift, daß die Schwerkraft nichts ausrichten kann in der ihr zugemutheten Weise mag immerhin ausrechnen, wie groß der Widerstand für einen Quadr.-Cm. der Reibungsfläche sein darf, die Drehkraft der Schwere zu paralyfieren. Sie wirkt etwa wie ein anhaltender Fingerdruck des Fötus! DUNCAN verkannte diese Verhältnisse so, daß er meinte, der Fötus sei kein Seiltänzer, daß er sich gegen die drehende Wirkung der Schwere in seiner Lage halten könne! Nur bei excessiver Weite des Uterus, in den ersten Monaten und bei starkem Hydramnion ist die Schwere ein (nicht aber »das«) lagenbestimmende Moment; Stellungswechsel hervorzubringen ist ihr bei recht schlaffem Uterus offenbar auch noch in den späteren Monaten unter sonst normalen Verhältnissen möglich. Hier liegt der Schwerpunkt, wenn wir die Scheitel-Steiß-Linie als Drehungsaxe haben, so weit peripher, nach dem Rücken hin; hier sind die Reibungswiderstände, wie oben schon angedeutet, so viel kleiner, weil

auch sie nicht weit von der Drehungsaxe liegen, hier sind nur minimale oder gar keine Ausbuchtungen nöthig, wenigstens bei Bewegung des Rückens entlang der Vorderwand, die sich frei vorwölben kann. So habe ich für meinen Theil gegen HÖNINGS Beobachtungen¹⁾ ob sie auch nicht zahlreich sind, nichts einzuwenden: 14 mal fand er mehrere Stunden nach dem Hinlegen aus erster Schädellage zweite entstanden, wobei der Rücken immer vorn sich bewegte; in mehreren Stunden oder bei Nachhilfe unserer palpierenden Hände, des Stethokops u. s. w. ist das schon auch der Schwerkraft möglich. Dafs günstige räumliche Verhältnisse selbst für diese relativ starke Entfaltung der Kraft nöthig, sagt HÖNING selbst.

Wäre es der Natur nicht gleichgültig, ob erste oder zweite Lage, sie hätte längst Mittel gefunden, der Schwere zu wehren, während der langen Entwicklung unseres Geschlechtes, wie sie die Schief lagen auch fast vertilgt hat: denn diesen Lagewechsel zwischen Kopf- und schiefer Kopflage darf und muß man auch in vielen Fällen der Schwerkraft zuschreiben.

Dafs die Kraftentfaltung der Schwere bei Positionswechseln gröfser ist, beweist POPPELS²⁾ und Anderer experimentelle Beobachtung, dafs ein Fötus im Wasser immer so zu Boden fällt, wie man ihn auf die Oberfläche legt, aber den Rücken dabei nach unten dreht!

LUSK³⁾ gibt auch der Schwere die Stellungswechsel, KLEINWÄCHTER⁴⁾ ist dagegen: sonst müfste zweite Steifslage sich zu erster an Zahl ebenso verhalten, wie die Schädellagen. Ich bin nun weit davon entfernt, dem Uterus eine active Wirkung bei den Stellungswechseln abzusprechen, doch kommt es mir ja nur darauf an, der Schwere keine ihr mögliche Bewegung abzuleugnen, und da will ich nur daran erinnern, dafs sich manches vielleicht damit erklären liesse, dafs das unregelmässiger geformte Beckenende im unteren Uterinsegment mehr Drehungswiderstände findet als im oberen, dafs hingegen der Schädel viel öfter ins Becken eintritt während der Schwangerschaft etc.

¹⁾ l. c. S. 99 f. ²⁾ l. c. Bd. 32. ³⁾ u. ⁴⁾ l. c.

BRAUN¹⁾ gibt selbst Positionswechsel nur bei lebendem Kinde zu!

Was die macerirten Früchte betrifft, so wären hier allerdings die Widerstände kleiner, aber doch wohl auch die bewegenden Kräfte, denn wenn hier der spec. Schwerpunkt zum Beckenende hin wandern soll, kann ich mir das, in Übereinstimmung mit der Beobachtung GASSNERS²⁾, daß macerirte Früchte gegenüber lebenden aus dem gleichen Monat und von gleicher Länge und Breite auffallend leicht sind, nur so denken, daß das Fruchtwasser dem specifisch schwersten Theil des Scheitelendes, der Schädelkapfel, leicht seine schwersten Theile auslaugen kann, nicht so gut aber den Beckenknochen, wodurch das Fruchtwasser specifisch schwerer wurde und die 100 gr. um ein Beträchtliches vermindert werden müßten bei der gegenseitigen Annäherung der specifischen Gewichte der zwei in Frage kommenden Körper.

Endlich wissen wir ja überhaupt noch nicht, wo ihr Schwerpunkt in ihrem Fruchtwasser liegt, und die Resultate der Schwimmversuche sind mit MEEH³⁾ leicht durch SPIEGELBERGS Annahme zu erklären, daß das specifische Gewicht des tiefer liegenden Theiles sich erhöhen muß; so daß umgekehrt, wie es jene Herren wollen, die Lage des Kindes seinen spec. Schwerpunkt bestimme.

Die Wirkung der Schwerkraft ist also jedenfalls eine so äußerst minimale, daß wir sie ganz außer Acht lassen können, wenn sie auch selbstverständlich immer auf die Lage wirkt, sobald der spec. Schwerpunkt excentrisch liegt oder vielmehr nicht im Centrum der verdrängten »Wasser«masse; ebenso wie es Niemand leugnen wird, daß sie auf die Bewegung des Harns und Darminhaltes und auf die Geburt von Einfluß ist. Eine Kraft aber, welche die Lageveränderung unter normalen Verhältnissen nicht erklärt, kann auch nicht die Häufigkeit der Lage erklären, das ist gewiß klar; und selbst in den sicher wenig Schwangerschaften, wo nie Beckenendlagen da waren, wäre noch nachzuweisen, daß die Schwere gerade zu der Zeit, wo der Uterus anfang, die Querlage auszuschliessen, den Kopf

¹⁾ l. c. ²⁾ M. f. G. Bd. 19 S. 11. ³⁾ Archiv f. G. Bd. 20, S. 191.

nach dem Muttermund hin gebracht hätte, von welchem Beweis ein Theil auch die Bestimmung des Schwerpunktes im Fruchtwasser resp. einer Flüssigkeit von dem spec. Gewicht des Fruchtwassers in dem betreffenden Fall wäre.

Aber wenn auch die Schwere den Kopf regelmäfsig tiefer stellen würde: der Uterus müßte doch die Längslage herstellen und erhalten: sei's auch manchmal erst bei der Geburt.

Lagewechsel durch die Schwere sind also nur bei starkem (negativem) Mißverhältnifs zwischen Kind und Uterus möglich. Stellen wir uns aber einmal auf HÖNINGS Standpunkt, so fällt es uns doch auf, wie er, beim Versuch, die Wechsel von Kopf in Beckenlage und umgekehrt zu erklären, in Wirklichkeit nur zu bleibenden Beckenlagen kommt,¹⁾ während diese doch, nach allen (auch HÖNING selbst) Untersuchungen über Lagewechsel so sehr wenig stabil sind. Hätte er einen strikten Nachweis zu führen versucht, so wäre es ihm wie SCHATZ ergangen, der dadurch abtrünnig ward. So genügte ihm die Heranziehung der Muskelkräfte in zweiter Linie. Er glaubt selbst von forcirten Kindsbewegungen, daß sie nur schwer den Fötus der Schwere entgegendrehen und ihn vollends nicht gegen sie in einer Lage halten können. Die letztere Funktion hat ja der Uterus; aber 10—20 gr. werden ja auch durch die geringste Muskelkraft bewegt. Daß HÖNING oft minutenlang dauernde Kindsbewegungen ohne solchen Effekt gesehen, spricht nicht dagegen; er hat sie offenbar nur im Fundus gesehen, wo wenig feste Abstoßungspunkte. Eher beweist diese Beobachtung, daß, da die Beine nach SCHATZ über 1000 gr. haben, die Schwere, eine vergleichsweise so schwache, wenn auch andauernd wirkende Kraft erst recht nichts ausrichten kann.

So bleiben uns nur physiologische Kräfte, von gleichgültigen oder zufälligen Einwirkungen physikalischer abgesehen, welche doch nur dann wirken können, wenn jene es gestatten. Ich hielt es für nöthig, erst die Nichtigkeit dieser überall störenden Theorie wieder im Zusammenhang nachzuweisen, um nicht immer wieder auf sie zurückkommen zu müssen.

¹ l. c. S. 102/103.

Sehen wir uns nun das Material der hiesigen Frauenklinik in Rücksicht auf die für Beckenendlage als günstig angeführten Momente an. Ich werde zu beachten haben, daß die Differenzen, wenn sie zum Beweise taugen sollen, größer sein müssen als die unvermeidlichen Beobachtungsfehler; um derentwillen werde ich, wenn auch im Allgemeinen ziemlich sicher, doch im Einzelfall oft nicht für Genauigkeit einstehen können.

Die Journale werden von Praktikanten der Klinik unter Beihülfe von Assistenten oder sonst schon Geübten, und auch von diesen selbst geführt. Immerhin muß man aber wohl damit rechnen, daß schon bei der Beobachtung manches übersehen werden kann, besonders wenn sich das zu Beobachtende in zu großer Menge bietet, die Masse des Materials die Arbeitskräfte zu erdrücken droht; daß ferner von der Beobachtung bis zum Fixiren derselben in dem, wenn auch so ausgezeichnet wie dem hiesigen, eingerichteten Journal ¹⁾ manches verloren gehen oder eine kleine Metamorphose durchmachen kann — das Gefundene auch je nach der Individualität des Untersuchenden oder den Befund Niederlegenden in mehr oder weniger individuell abgetönter Färbung zur Darstellung gelangt, die der später aus dem Material Schöpfende bei Unkenntniß der darstellenden Individuen für verschiedene Farben des Dargestellten nehmen muß; so kann das weiter auch auf dem Weg ins Hauptbuch geschehen, das ich theilweise benutzen mußte, und endlich will ich doch auch für mich keine Unfehlbarkeit proklamiren zu wollen scheinen, in Wiedergabe des Gefundenen und auch schon im Finden des Vorhandenen, besonders wenn die bemerkten Unregelmäßigkeiten nicht an gewohnter Stelle aufgezeichnet waren: so daß wir hier schon eine Reihe allerdings im Einzelnen kleiner Fehlerquellen

¹⁾ f. Ber. u. Stud. I.

haben; vielleicht kleiner oder doch sicher nicht größer wie sonst irgendwo, wo bei der gleichen Ausdehnung des Materials, die die Einzeluntersuchung sehr oft weniger sorgfältig macht, der Chef dazu weit weg wohnt.

Urfächliche Momente von geringer Bedeutung können so manchmal verschwinden.

Ich habe also die Journale bis VI. 86 durchgesehen. In diesen sind von December 1883 bis April 1884 nur die auf der »klinischen« Abtheilung, weiterhin, von der Übernahme durch den Staat an, alle auf beiden Abtheilungen beobachteten Geburten beschrieben, von zusammen 2152 Frauen 2181 Früchte, worunter 90 mit 94 Beckenendlagen, über 4,3% oder wenn wir die 16 Journale mit Aborten, Blasenmole und sonst nicht notirten Lagen abzählen, 4,35%. Ich werde folgende die Resultate des Vergleichs dieser Geburten mit den übrigen bringen.

Sonderbar erscheint die gleiche Vertheilung der Geschlechter bei den Beckenlagen, 37 w. 36 m. (excl. der Zwillinge), davon 10 weibl. unter 18 mac. Früchten; während im Allgemeinen ein Verhältniß von nicht einmal 9:10 besteht; bei den übrigen macerirten freilich haben wir auch 25:25.

Nach Abzug der Zwillinge, der Macerirten und des Anencephalus haben wir im Ganzen 55 unter 2035 oder 2 $\frac{2}{3}$ %; von den Beckenlagen also nicht viel mehr wie die Hälfte, 6:10, von den andern 9:10.

Wenn wir für die verschiedenen Zeiten der Geburt nach Erst-, Mehr- und Viel (über V.) gebärenden sondern, die Beckenendlagen und die übrigen Lagen nebeneinanderstellen, erhalten wir folgende Tabelle:

1) reif 27 : 1681, fast 1,6 %	8 : 640	12 : 878	7 : 163
2) 10. Monat 9 : 203, 4 $\frac{1}{4}$ %	5 : 86	4 : 102	0 : 15
3) 8. u. 9. Monat 6 : 73	2 : 34	2 : 34	2 : 5
4) 6. u. 7. „ 8 : 19	5 : 9	3 : 10	0
5) bis 5. „ 5 : 4	1 : 1	2 : 3	2 : 0

Zum Vergleich setze ich die Tabellen von SIMPSON ¹⁾ (nach DUBOIS) und VEIT ²⁾ her, nur nach den (3) Lagen innerhalb der einzelnen Monate gefondert:

I.

1) reif, lebende und todte	1	3	96%
2) 8. u. 9. Monat nur todte	2	22	72
3) 7. Monat lebende u. todte	6	31	82
4) vor 7. Mon. „ „ „	5	51	65

II.

1) 8. und 9. Monat, lebende	5	39	282
2) 5., 6. u. 7. „ „	5	25	66

Es fragt sich nun, dürfen wir, da sich die Erst- zu den Mehrgebärenden im Haufe wie 831 : 1320 verhielten (von einer Frau ist die Geburtszahl nicht angegeben) oder 1 : 1,6; draussen dagegen, wenn wir 5 Kinder als Durchschnitt nehmen, wie 1 zu mehr als 4 (da ja nicht jede Frau auch Mutter wird): ob wir die Zahl der Mehrgebärenden in den Tabellen einfach mit 3 (mehr als 4 getheilt durch nicht ganz 1,6) vervielfachen dürfen, um annähernd das wirkliche Verhältniß zu erhalten. — Das nebenbei!

PFUND ³⁾ hat übrigens hier bei 115 engen Becken 74% Mehrgebärende gefunden gegen 60 im Allgemeinen, so dafs die Begünstigung der Beckenendlagen durch wiederholte Geburt zum Theil daher rührt.

Bei den reifen Früchten haben wir ein Verhältniß von Erstgebärenden 1 : 80 oder 1,23%.

Mehr- 1 : 75

Viel- 1 : 23 oder 4 $\frac{1}{6}$ %.

¹⁾ l. c. S. 643. ²⁾ Scanconis Beiträge, Bd. IV, 284.

³⁾ Differt. inaug. 1885.

Also bei den letzteren $3\frac{1}{2}$ mal so viel Beckenendlagen wie bei den I. p., aber hier immer noch nicht der allgemeine Procentatz erreicht. Erst im 10. Monat wird er erreicht oder sogar überschritten, was allerdings meine Zahlen direct nicht fagen, wohl aber, bei ihrer Kleinheit genügend, andeuten, indem ja im 10. Monat derselbe schon im Allgemeinen fast erreicht ist. Im 8. und 9. Monat betragen die Beckenendlagen $\frac{1}{13}$, im 6. und 7. schon gegen $\frac{1}{3}$, über $\frac{2}{7}$, in der ersten Schwangerschaftshälfte kommen gar die Hälfte mit dem Beckenende voran, und noch ausgesprochener wird der Einfluß der Zeit, wenn wir die 3 kleinsten macerirten Früchte noch hinzunehmen, indem ja die Maceration in jener Zeit nicht viel bedeuten kann.

Ich meine aber, es sei deutlich genug, daß der Uterus, der in der zweiten Hälfte des 7. Monats seine Kugelgestalt verliert, es ist, der die Lage bedingt.

Daß unter den ersten 7 Monaten keine sichere Schiefelage notirt ist, wird Niemand wundern, der sich an die Leichtigkeit der »Selbstwendung« in diesen Fällen erinnert. In der That soll bei dem kleinsten der in Beckenendlage Geborenen erst der Arm in der Scheide vorgelegen haben, dann aber die Nachgeburt mit centralem Eirifs vor dem Kind gekommen sein. Dieses und das nächste stammen von derselben Vielgebärenden. Bei zwei Mehrgebärenden der 4. Gruppe ist die Kopflage übrigens auch als fraglich bezeichnet.

Im 7. Monat haben wir nur Fußlagen; später die Hälfte Steißlagen, eine nicht näher bezeichnet.

Wenn der, hauptsächlich durch mehrmalige Geburt schlaffere Uterusmuskel dem Kind eine größere Freiheit der Lagerung gewährt, so kann diese auch durch den Zustand des Kindes selbst erreicht werden, wenn es Bewegungen, Haltung, Tonus und Elasticität verloren, resp. auch nur zum Theil verloren hat, wenn es macerirt ist. Vielleicht wird auch manchmal durch dieselbe Ursache, die das Kind absterben macht, der Uterus schlaffer.

Ich fand einfache macerirte Früchte 20 unter den Beckenendlagen zu 51 anderen, über 28⁰/₁₀ oder fast ³/₁₀ aller mac.

- 1) Reif war ein Kind einer mp. in Beckenendlage, eines einer pl. p. und zwei von mp. in Kopflagen, dabei eine Mutter mit Cervicalcarcinom.
- 2) Aus dem 10. Monat stammen je 3 Kinder von I und von pl. p., unter den letzteren eins in Schief-, die andern in Kopflage.

3) 8. und 9. Mon.	8 : 15	4 : 4	3 : 9	1 : 2
4) 6. und 7. „	9 : 25	6 : 10	2 : 12	1 : 3
5) bis 5. Mon.	2 : 1	1 : 1	0	1 : 0

In der 4. Gruppe sind 3 Schief-lagen enthalten, in der 2. und 3. je eine fragliche Kopflage. Unter 19 macerirten sind 1 Knie-, 8 Fuß-, 10 Steiß-lagen.

VEIT findet bei „todten“ Früchten folgendes:

- 1) 8., 9. M. 2. 24. 40.
- 2) 5., 6., 7. „ 10. 20. 47.

SIMPSON¹⁾ bringt von COLLINS 16654 Geburten bei, davon 527 macerirte, wovon 1 Beckenendlage auf 6 andre kam, von den übrigen 1 : 62. (Querlagen 1 : 88 resp. 5,55.)

OSTERLOHS²⁾ Zusammenstellung stimmt hier besser mit meinem Material: unter 3153 Geburten fand er 87 macerirte Früchte oder 2,7⁰/₁₀, wovon der 3. Theil in Beckenendlage; in den ersten 5 Monaten 5, im 6. und 7. Monat 10.

Die Zunahme der Beckenendlagen nach den ersten Monaten hin ist hier nicht recht ausgeprägt, ebenso die mit der Zahl der Entbindungen. Es sind aber überhaupt etwas mehr Vielgebärende hier vertreten, nämlich 10 unter 71 gegen 194 unter 2035 mit nicht macerirten Kindern.

¹⁾ l. c. 426.

²⁾ Winckel, Ber. u. Stud. Bd. II. S. 145.

Ganz unregelmäßige Verhältnisse in der Gestaltung des Uterininhalts sind bei Zwillingen gegeben; sie können sich der normalen Höhle oft in verschiedenen Lagerungen zu einander gleich gut anpassen.

Unter 29 Paaren kamen 4 mal beide Kinder in Beckenendlage, einmal ist vom ersten Kind die Lage unbekannt, 8 mal kam nur das zweite in Beckenendlage, einmal das erste. Von 57 Zwillingsskindern kamen also 18, nicht ganz $\frac{1}{3}$, in Beckenendlage. Unter den ersten 4 Fällen ist ein macerirtes Kind.

VEIT fand unter 661 Fällen Beckenendlage des ersten Kindes in 25,87 $\frac{0}{0}$, des zweiten in 34,34 $\frac{0}{0}$; Schiefagen des ersten 1,66 $\frac{0}{0}$, des zweiten 7,41 $\frac{0}{0}$: es sind meist sekundär entstandene!

Bei jeder zweiten Zwillingsgeburt käme mindestens ein Kind in Beckenendlage. Näher auf die Urfachen einzugehen, lohnt bei so complicirten Verhältnissen nicht; nur soviel, daß die überwiegende Mehrzahl von Mehrgebärenden stammt und daß sie fast durchgehends klein und leicht sind. Ein Zwillingspaar lag übrigens von vorn herein schief.

Mißbildungen der Frucht können hinwiederum dazu führen, daß sich dieselbe in ganz beliebiger Lage oder doch in beliebiger Längslage oder gerade in umgekehrter Lage wie normal dem Uterusraum am besten anpassen kann.

Das einzige in der hiehergehörigen Weise mißbildete Kind aus den 2 $\frac{1}{2}$ Jahren, ein Anencephalus, ward in Fußlage geboren. „Viel Fruchtwasser“ ist dabei bemerkt, wie das ja dabei sehr häufig ist¹⁾. Daß sie ebenso oft mit dem Beckenende, als dem Kopfe voraus geboren werden, wird überall, auch von SCHRÖDER, zugegeben; ebenso, daß oft Brust und Schultern sehr breit — in meinem Fall kann ich das allerdings nicht mit Sicherheit behaupten. Aber da also der Hals fehlt, dazu der sonst im unteren Uterinsegment und Becken feststehende Kopf hier sehr klein ist, ist es doch nicht schwer einzusehen, warum öfter Beckenendlagen vorkommen. Daß sie nicht noch

¹⁾ Hohl, Geburten mißgestalteter etc. Kinder, 1850, S. 65.

häufiger find, ist offenbar kein Einwurf gegen die Accomodationstheorie; es wären vielleicht vergleichende Messungen von Brust- und Kopfumfang mit dem des Beckenendes anzustellen.

Die häufigste und am meisten in dieser Richtung besprochene Mißbildung, Hydrocephalus kam nicht vor.

Nach SIMPSON, resp. KEITH, lagen 10 von 69 mit dem Beckenende vor, einer schief. Es ist schade, daß nirgends auf den Grad der Mißbildung geachtet wurde.

Jene Mißbildung des Eies, (wenn sie auch vielleicht mitunter durch abnorme Beschaffenheit des Uterus bedingt sein mag), die wir als Hydramnion bezeichnen, können wir als das bis an's Ende der Schwangerschaft fortgesetzte Verhältniß der ersten Monate betrachten, oder doch früherer Monate.

Eine Fruchtwasseranhäufung in höherem Grad kam bei einfachen Früchten in Beckenendlagen 3 mal, bei Kopflagen etwa 8 mal vor. Unter den ersteren eins, unter den letzteren zwei normale ausgetragene Kinder. Die Mutter war in zwei Fällen mit Schädellage I. p., in zwei und in einen Fall mit Steißlage m. p.

Das letztere stimmt mit dem von M'CLINTOCK ¹⁾ gefundenen, unter 33 Fällen 28 Mehrgebärende; aber 25 Mädchen fand er — ich fünf.

Bei der letzterwähnten VI p. betrug das Fruchtwasser über 2,5 L.; die C. v. scheint verengt, nach dem D. B. zu schließen ist sie so groß wie der biparietale Durchmesser; unter den früheren Entbindungen waren zwei Fußlagen und eine Wendung, diesmal war vor drei Wochen noch Schädellage vorhanden.

Die Fußlage einer IV p. mit luetischem Kind vom IX. Monat könnte aus den Verhältnissen der Nabelschnur abgeleitet werden, vgl. später!

Den selben Einfluß, wie Mißbildungen der Eitheile, haben auch oft solche des Fruchthälters, sowohl auf die Gestaltung

¹⁾ Vgl. Schröder l. c. 439.

feiner Höhle im Ganzen, als besonders auf die des unteren Segments.

Von hierher gehörigen Fällen fand ich einen Uterus introrsum arcuatus mit Beckenenge (C. v. 0,3 kleiner als der biparietale Durchmesser) und etwas überhängendem Bauch, Nabelschnur 82 cm., umschlungen und zwischen den Beinen durchgehend, Eihautrifs 12 cm. vom Placentarrand, vor vier Wochen noch Schiefelage; bei einer III p.; und einem bei einer I p. mit macerirtem Kind vom 8. Monat, Nabelschnur 52, fest umschnürt, beide in Beckenendlage, und einen bei einer I p. mit Gesichtslage. Auch eine hohe Cervicalstenose bei einer I p. mit Schiefelage dürfte hierher zu rechnen sein.

Ähnliche Anomalieen der Accomodationsflächen können natürlich auch durch Geschwülste des Uterus und seiner Nachbarorgane herbeigeführt werden, doch habe ich allerdings keinen Fall mit genau beschriebener Geschwulst gefunden, so, daß ich ihn gut hätte verwerthen können. Bei einer I p. mit einem Kind vom 7. Monat, dessen 32 cm. lange Nabelschnur umschlungen war, in Beckenendlage, wo vier Wochen a. p. die letzte Regel, seitdem Hydrorrhöe, und bei drei Kopflagen fand ich Uterusmyome beschrieben. Bei einer II p. mit Beckenendlage, acht Tage vorher Schädellage, fand sich ein kleines Myom am Abgang des linken lig. rot.

Ob daselbe einen merkbaren Einfluß auf die Entwicklung dieses Bandes, dem BUDIN große Wichtigkeit beilegt, gehabt haben mag?

Uterinkrebse fand ich drei, einen mit macerirtem Kind, keine Beckenendlage.

Bei der Häufigkeit der Sterilität im Gefolge dieser Bildungen, alle darf ihre Seltenheit bei Gebärenden nicht befremden. So fand STRATZ¹⁾ unter 17900 Geburten nur 26 Tumoren.

In dem Einfluß auf die Entwicklung eines bestimmten Uterintheils dürfte auch der Einfluß der Placenta praevia auf die Lage zu suchen sein: der Uterus wird mehr eiförmig,

¹⁾ Ref. im Centralbl. f. G. 1886, No. 39, 643.

ellipsoidisch, sein unterer Theil wächst sich besser aus¹⁾ — weniger in ihrer „raumbefchränkenden Masse“. Meine zwei Fälle bei den Beckenendlagen allerdings befagen hier gar nichts, da die zugehörigen Kinder vom 5. und 6. Monat stammen.

Unter den übrigen Geburten find sieben Fälle zu finden, darunter eine centralis, ferner je eine Frucht von 5, 6 und 8 Monaten. Das spräche eher dafür, daß Placenta praevia nur als Ursache zu frühen Geburten mehr falsche Lagen im Gefolge hat.

SIMPSON fand bei 360 Fällen 17 Schief- und 39 Beckenendlagen.

Das wären allerdings zu wenig, wie HÖNING²⁾ richtig bemerkt, wenn der Uterus immer eine streng-ellipsoidische Form annähme; aber die Hälfte der Fälle müssen doch auch dann nicht Beckenendlagen sein; davon später!

Daß es die Raumbefchränkung allein ist, die bei Plac. praevia die Zahl der Kopflagen so herabgesetzt, dagegen spricht neben der Beschaffenheit dieser Placenten auch der Umstand, daß beim Sitz am andern Uteruspol (auf den man ja aus dem centralen Eihautriß mit einiger Sicherheit schließen kann) die Beckenendlagen nicht vermehrt sind; auch sie verkürzt ja die Längenaxe wie jene, und könnte durch Veranlassen von Lagewechseln leicht die Kopflagen vermindern.

Ob sie CHARPENTIER auch unter seiner „falschen Placentarinfection“ einbegreifen wollte?

Wir haben bei 87 von 406 Kopflagen centralen Eirifs, ebenso bei 12 Beckenendlagen, resp. vom 7. Monat ab 10, unter 46 nicht macerirten verzeichnet; am Rand der Placenta fand sich 39, und 7 resp. 6 mal der Rifs; hier wieder ein Mehr bei den Beckenendlagen.

Die 406 deswegen durchgesehenen Journale sind die der Monate XII. 83, IV. 84, IX. und X. 85 und VI. 86. Ich hielt es nicht für der Mühe werth, alle Journale anzusehen, und glaube darin den Ausdruck der Häufigkeit schon sicher

¹⁾ Müller, Placenta praevia, 1877, S. 164 ff.

²⁾ l. c. S. 107.

so genau zu haben, als es für so nebenfächliche Untersuchungen nöthig, oder möglich bei der kleinen Zahl der Beckenlagen.

Kürze, resp. noch eher verkürzende Umschlingung der Nabelschnur (da die Umschlingungen, wenn sie auch meist nicht unlösbar sind, fast immer mehr excentrisch liegen) können gewiss manchmal die Ursache von sonst räthselhaften Beckenend-, ¹⁾ Quer- und Kopflagen sein, wo man eine andre Lage zu erwarten wäre berechtigt gewesen. Und zwar wird man sie dann bestimmt dafür in Anspruch nehmen dürfen, wenn man weiß, von welchem Punkt der Uterinwand die Nabelschnur abgeht, und wie lang sie bis zur Befestigung — nicht einfach bis zur nächsten Umschlingung, sondern bis dahin, wo die Schlinge so liegt, daß sie sich nicht leicht abwickeln ließe — am Kind ist, und wie weit dieser Befestigungspunkt von den beiden Enden des Kindes entfernt liegt. Ist die freie Strecke der Nabelschnur länger als bis an das entferntere Ende des Kindes, so gestattet sie dem Kind auch noch jede Lage; beide Längslagen aber z. B. allein kann sie auch schon bei viel geringerer Länge gestatten, wenn der Abgangsort vom Uterus günstig, das heißt mehr in der Mitte zwischen Hals und Grund liegt, und ebenso die Befestigungsschlinge; liegt diese aber, wie gewöhnlich, excentrisch am Hals, so wird bei genügender Verkürzung sie den Kopf ihrem Placentarursprung näher halten, und da für gewöhnlich dieser Ursprung durch Entwicklung des unteren Uterinsegmentes mehr nach oben zu rücken wird, wird im Allgemeinen die Nabelschnur eher „das Herabsinken des Kopfes hindern“, wie KLEINWÄCHTER meint. Und sie wird noch wahrscheinlicher als Ursache, wenn das Kind abstirbt, so daß wir seinen Tod der Nabelschnurspannung beimeßen können, wie Herr Geheimrath WINCKEL es schon früher ausgesprochen. Aber zu einer gewissen Sicherheit zu gelangen, wird schwer sein, und bei Schädellagen finden sich eben solche Fälle.

So könnte man vor allem solche Umschlingungen für die Beckenendlage verantwortlich machen in 2 meiner Fälle, wo sie 57 cm. und 2 mal, und 80 cm. und 3 mal umschlungen war; beim ersteren Fall wurde das Kind todt geboren, beim

¹⁾ Winckel l. c., Kleinwächter l. c.

zweiten starb es sofort, der Eihautriß war beidesmal central, so daß man hier leicht an ein Festhalten des umschlungenen Halses im oberen Uterusabschnitt und ein Stranguliren beim Herabrücken inter partum denken kann. Beim ersten Fall war auch die C. v. um 1 cm. kleiner als der biparietale Durchmesser des Kindskopfes und leichter Hängebauch, bei einer I p.

In einem weiteren Fall war die Nabelschnur 42 cm., 2 m. umschlungen; 58 u. 3 m.; 50 u. 3 m., aber um den Leib, dabei am Rand der Placenta inferirend, das Kind asphyktisch. Der erste und dritte Fall von I p., die andern drei von II p. Bei einer IV p. mit Hydramnion war die 39 cm. lange Nabelschnur um das 46 cm. lange Kind (mit enorm großer Leber) geschlungen, der Eihautriß der Nabelschnurinfection gegenüber. Schnellere Placentarlösung (d. h. Zerrung) war nicht nachzuweisen. Alle sechs sind Fußlagen!

Herr Geheimrath WINCKEL fand Nabelschnurumschlingungen bei Beckenendlagen etwas häufiger: 33,3 % gegen 27 %.

Ich finde sie bei 16 Fällen unter 55 nicht macerirten, resp. unter 45 vom 7. Monat ab, vom 10. Monat an sogar 15 unter 36. Darunter ein Fall von Reiten auf der Nabelschnur; in drei Fällen doppelte, in zwei dreifache Umschlingung. Unter 20 macerirten, resp. 14 vom 7. Monat ab dreimal; eben so oft unter den 18 Zwillingkindern in Beckenlage. —

Eine solche geringe Vermehrung der Umschlingungen befagt natürlich nichts weiter, als daß einer Geburt in Beckenendlage mehr Lagewechsel vorausgehen, und wo mehr von diesen, bleiben auch schließlich mehr abnorme Lagen, denn keine Lage ist so stabil, wie die Schädellage, und die andern werden immer und immer wieder in sie verwandelt.

Dem entsprechend fanden VALENTA ¹⁾ und FASBENDER ²⁾ mehr Umschlingungen bei Lage und Stellungswechsel (was zugleich eine gewisse Unvollkommenheit solcher Untersuchungen beweist: außer durch Wechsel kann ich mir nicht leicht eine Umschlingung entstehen denken; es müßte denn ein sonderbares Wachsen der Nabelschnur sein, bei dem sich

¹⁾ M. f. G., Bd. 25, S. 172. ²⁾ Berliner Beitr., I, S. 48.

Schlingen wie beim Laffowerfen um das Kind legen). Und Herr Geheimerath WINCKEL¹⁾ fand bei Mehrgebärenden doppelt so viel Fälle, wie bei Erstgebärenden. Ich habe allerdings 7 I p. bei den nicht macerirten, die Mütter mit mace-
rirten sind es alle drei, von den drei mit Zwillingen ist es eine.

Es sind Nabelschnurumschlingungen und Beckenendlage nicht Ursache und Wirkung, sondern Wirkungen einer Ursache.

OSTERLOH²⁾ hat aber sogar in 150 Fällen, bei denen die von Herrn Geheimerath WINCKEL vorher bearbeiteten sind, nur 27 Fälle von Nabelschnurumschlingung um den Hals gefunden.

KLEINWÄCHTER sagt: „Nicht so selten werden die Beckenendlagen durch eine lange Nabelschnur bedingt. Dieselbe schlingt sich um den Hals und verhindert das Herabsinken des Kopfes“. Der Länge kann ich keine Schuld beimesse; aber eine längere Nabelschnur wird bei den Drehungen des Kindes leichter Umschlingungen bilden und erhalten können, da dann meist keine besondere Ursache besteht, daß sie sich lösen; sind sie aber einmal auf die nämliche Länge verkürzt, wie die andern, werden sie drum nicht leichter weitere Schlingen bilden, weil sie vordem lang waren, und eine freie Strecke der Nabelschnur von 30 cm. läßt jedem Kind alle Lagen frei, mag die Umschlingung auch ganz am Ende sitzen.

Vielleicht aber könnte die Länge der Nabelschnur allerdings in so ferne in Betracht kommen, als nach MAGGIA³⁾, je länger sie (und je mehr Fruchtwasser), desto weniger die Frucht entwickelt sein soll. Den ursächlichen Zusammenhang dieser Faktoren hat mir freilich M. nicht erklärt.

Die Durchschnittslänge beträgt bei meinen nicht mace-
rirten Beckenendlagen vom 7. Monat an, der umschlungenen $51\frac{1}{4}$, der nicht umschl. 44,3. Der ersteren Länge schwankt von 82 bis 32, die letzteren von 71 bis 31 cm.

Ein genauer Vergleich müßte freilich auch die Länge des Kindes vom Scheitel zum Steiß berücksichtigen.

¹⁾ I. c. Bd. III, S. 43. ²⁾ ib. II, 145.

³⁾ Nach d. Ref. im Centralbl. f. G., 1886, No. 45, S. 743.

Das waren die von Seite des Eies und Uterus direkten wichtigen Momente; es bleiben noch weiter aufsen vorkommende, die Lage beeinflussende Veränderungen, die allerdings auch zum grössten Theil indirekt durch Änderung in Gestalt und Beschaffenheit des Uterus wirken; von den Weichtheilen berücksichtige ich nur Veränderungen in der Beschaffenheit der Bauchdecken, unter den harten die des Beckens. (Geschwülste wurden schon erwähnt).

Eine feste, mädchenhafte Bauchwand wird ebenso wie der zum ersten mal geschwängerte Uterus nicht so leicht wenigstens eine Querlage zulassen, wie eine schlaffe, und gar die extrem schlaffe, der Hängebauch. Nur diese letzte Änderung ist so hervorstechend, dass man sich auf ihre Erwähnung in den Journalen mit hinreichender Sicherheit verlassen können. Und beim Becken liegt die Sache nicht ganz unähnlich: äusserlich gemessen ist es zwar nur in ganz vereinzelten Fällen nicht, und in dem Verlauf der Geburt haben wir ja auch schon einen Indicator zu seiner Beurtheilung, aber zu einem genauen Vergleich wäre die innere Messung erforderlich, und die C. D. ist nur in seltenen Fällen, von starker Beckenenge abgesehen, gemessen.

Hinweise auf den Zusammenhang von Beckenenge und abnormer Kindslage fand schon SIMPSON¹⁾ in der älteren Litteratur. In MICHAELIS' klassischem Werke²⁾ wird betont, dass es falsch, und weit seltener der Fall sei, dass das enge Becken allein durch direkte Behinderung der Geburt schade, dass vielmehr „der schädliche Einfluss desselben auf die Wehen, ganz besonders auf die Stellung des Kindes, die häufigste, und, alles erwogen, auch nachtheiligste Folge des engen Beckens sei“; Uterus und Frucht bleiben hoch stehen, der Fundus fällt nach der Seite, drängt die Wand des oft kürzeren Bauches vor, und wenn die Frucht stärker zusammengekrümmt war, entsteht dann um so leichter Hängebauch. Hier spielt auch, bei Weiterentwicklung des Hängebauchs vor allem, die Schwerkraft eine Rolle; aber nicht die Lage des spec. Schwer-

¹⁾ l. c. 877. ²⁾ M. — Litzmann, d. enge Becken, II. Aufl. 1865, S. 55, 145 f., 152.

punkts im Fötus ist es, sondern die Schwere des Bauchinhalts der Mutter, die so auf die Kindslage wirkt. Mehr Entbindungen machen natürlich das Übel immer schlimmer, und so wird, nach MICHAELIS, das enge Becken auch Ursache zu Aborten, Wehenschwäche etc.

Hängebauch kam fünfmal vor bei je einer I, II, IV, V und XVI p. mit reifen Kindern in Beckenendlage. In einem Fall ist das Becken nicht gemessen, bei der V, II, und m. p. ist es verengt, C. D. 10,5 bis $10\frac{3}{4}$. Die IV p. hatte schon eine Schief- und Steifslage gehabt, bei der m. p. wechselte angeblich noch inter partum die Lage der Kindstheile und sie hatte zwei Tage a. p. noch Schädellage; die II p. mit vermehrtem Fruchtwasser, 18 Tage vorher. Die I p. könnte für die Nabelschnurumschlingungen in Anspruch genommen werden, s. o.

Bei den übrigen Lagen ist 24 mal Hängebauch notirt, 7 mal mit dem Zusatz „leichter“ oder ähnlichen Abschwächungen; darunter 3 I p., 7 m. p. Sechs Becken scheinen verengt, in einem Fall davon wurde perforirt. In einem Fall mit „sehr viel Wasser“ war acht Tage vor der Geburt des im 10. Monat stehenden Kindes noch Beckenendlage konstatirt worden, in einem andern schien bei Beginn der Geburt noch Schiefslage zu bestehen.

Wir können die Erschlaffung der Bauchwand, des Uterus und seiner Ligamente hierbei als höchsten Grad der Veränderungen betrachten, wie sie sonst durch vielfache Geburten regelmäßig gesetzt werden (Hängebauch kann ja außer durch Beckenge auch dadurch bedingt sein, und überhaupt auch ohne merkbare Ursache auftreten); und wir können das hier erhaltene Verhältniß an den Schluß der ersten Tabelle setzen. PINARD legt das Hauptgewicht auf die Erschlaffung der Bauchdecken, BUDIN und CHARPENTIER¹⁾ auf die Erschlaffung der ligamenta rotunda; ich glaube doch, daß auch der Uterus bei dieser abnormen Lage nicht seine Form wird streng erhalten können.

SIMPSON hat schon hervorgehoben, daß auch die Haupt-

¹⁾ Über alle drei s. bei diesem l. c. 240.

wirkung der Beckenenge die auf die Gestaltung des schwangeren Uterus ist, speciell des unteren Segmentes; welche Wirkung nothwendig wenigstens mit den höheren Graden von Beckenenge einhergehe. Selbst auch SCHRÖDER constatirt eine solche „Formlosigkeit“ bei Beckenenge.

Die Frequenz der Abnormität in der Anstalt ist nach PFUND ¹⁾ 9,58⁰/₀, eine C. v. von 9,5 abwärts gerechnet (wo von ²/₅ I p.)

Bei den 35 nicht macerirten Kindern in Beckenendlage vom 8. Monat an, bei denen überhaupt das Becken gemessen, oder ein bestimmtes Urtheil darüber abgegeben ist, beträgt die C. D. der Mutter 6 mal von 10 bis 10³/₄ cm., 3 mal 11, einmal ist „kleine Conj“ bemerkt. Darunter nur zwei I p., während z. B. HÖNING ²⁾ solche nur allein berücksichtigt unter dem Druck der früher herrschenden Meinung, daß bei Mehrgebärenden erst inter partum der Kopf in's Becken trete. Die Kinder sind reif. Weiter betrug in 6 Fällen der D. B. 18 bis 18,5 cm., dabei allerdings drei I p., einmal 18³/₄ (und vom 7. Monat gehört unter drei gemessenen zum stärksten Kind eine C. D. von 10 cm.)

Ich darf nun wohl sagen, bei den Beckenendlagen sind über 7 enge Becken gleich über 20⁰/₀, denn von den sechsen mit kleinem D. B. wird doch auch eins oder das andre verengt sein (nach MICHAELIS ³⁾ ist jedes zweite Becken bei D. B. unter 7“ verengt, und wenn das Pariser Zoll sind, wären's 19 cm., preussische freilich nur 18). Das wären also mehr wie doppelt so viel wie bei den Schädellagen; allerdings sind fast alle nicht gemessenen Becken wohl auch nicht verengt, so kämen noch sieben Fälle normaler Becken hinzu. In einem Fall kam viel Fruchtwasser dazu, in einem Uterus arcuatus.

Bei den sieben sicher verengten Conj sind drei Steißlagen, mit den 9 fraglichen vom 8. Monat ab aber zehn; im Allgemeinen sind es die Hälfte, und eine ist nicht näher bezeichnet. Bei den sieben nicht gemessenen Becken sind zwei. (Im 7. Monat nur Fußlagen). Das spräche nicht für KLEINWÄCHTERS oben angeführte Anschauung; doch wird von andern die größere Häufigkeit von Fußlagen bestätigt. ⁴⁾

¹⁾ l. c. ²⁾ l. c. S. 81 ff. ³⁾ l. c. S. 89. ⁴⁾ Schröder, l. c. S. 537.

Schiefagen fand ich nur drei bei engem Becken, davon die eine bei der Geburt aus Schädellage entstanden. SIMPSON fand bei 44 Kaiserschnitten 9 Beckenend-, und 5 Schiefagen.

Ich möchte es noch etwas genauer nehmen. Da die C. v. bei den Beckenendlagen nicht unter 8,6 heruntergeht, also hier, wenigstens bei I p., erst lange nach der ersten Ausbildung des unteren Uterinsegments ein Einfluß auf dessen Fortentwicklung angenommen werden könnte (während bei den übrigen Lagen mehrere C. v. unter 8 cm. verzeichnet find): so will ich den biparietalen Durchmesser und die C. v. direkt vergleichen; ich gehe dabei von der Vorstellung aus, daß, wenn der Beckeneingang dem sich weiter entwickelnden unteren Uterinsegment (mit dem darin enthaltenen Kopf) Eintritt oder Bleiben verwehrt, durch diesen Widerstand es noch zu Lagewechsel kommen kann. (Bei den folgenden Geburten wird es immer mehr zu Störungen der Uterinform kommen, noch ehe bei denselben die Beckenge direkt schaden konnte.

Hiervon kann zum Theil auch die relativ große Zahl von Mehrgebärenden bei den Beckenendlagen herrühren, da ja der biparietale Durchmesser des Kindes mit der Anzahl der Geburten und besonders dem Alter der Mutter ganz unverhältnißmäßig zunehmen soll, so daß männliche Früchte alter Vielgebärenden die breitesten Schädel hätten.¹⁾ Dann wäre an einen Einfluß der starken Entwicklung der Kinder zu denken, in so fern diese große, harte, wenig compressible Köpfe haben.

Daß man in München nicht mehr an die, noch immer von Schröder²⁾ vertretene, Ansicht glaubt, daß bei Mehrgebärenden der Kopf bis zur Geburt hochstehe, deutete ich schon an. Vielleicht ist der Befund von BRÜHL³⁾, daß bei ihnen doch in $\frac{1}{3}$ der Fälle der Kopf hochstehe, und dabei die Häufigkeit des hohen Standes mit der Zahl der Schwangerschaften, bei engen Becken schneller zunimmt, allgemein gültig.

Den Einfluß solcher Momente nachzuweisen (sicher hat

¹⁾ Schröder l. c. 626. ²⁾ ib. 115. f. auch Charpentier l. c. gegen Pinard. ³⁾ f. Centralbl. f. G. 1886 No. III, S. 36.

auch die Schwere der Geburt bei alten I p. etwas zu bedeuten) wird jetzt noch kaum möglich sein; indeffen spricht es doch für solche Erwägungen, wenn ich unter den wenig reifen Beckenendlagekindern solche von 54 und 54,2 cm. Länge und 3550 resp. 3850 gr. sehe, allerdings bei nicht zu weiter Conjugata, und wenn unter 10 nicht macerirten, einf. Kindern von 50 cm. und mehr nur drei Mädchen sind. So wäre bei den größten sowohl, als den kleinsten Kindern eine vermehrte Neigung zur Beckenendlage vorhanden.

Im Gegensatz zu engem Becken und hartem Kopf scheint mir wiederum ein im Verhältniß zum unteren Uterinsegment (mit dem Kopf) sehr weites Becken, wenn auch lange nicht in gleichem Grad wie enges, besonders aber bei schlaffer Beschaffenheit des Kindskopfes (Maceration), auch weniger günstig für Erhaltung der Kopf Lage. Wenn Kopf, Uterinsegment und Becken am besten ineinander passen, muß wohl die Schädellage am stabilsten sein. Das Becken scheint so weit werden zu können, daß es eine fast ellipsoide Form des Uterus gestattet; ich denke an die Fälle von BUDIN, wo der Steiß während der letzten Wochen im Becken stand.

BRAUN sagt, es kommen „Wechsel in der Regel nicht mehr vor, wenn der Kopf mit dem unteren Theil des Uterinkörpers in den Beckeneingang eingestellt wird, und die runden Mutterbänder hinreichend straff bleiben“; und ähnliches findet man bei allen Untersuchern des Lagewechsels. Zwar tritt auch mitunter der Kopf wieder aus und läßt Lagewechsel zu, so bei HÖNING in Fall 1,45, und 51; FASBENDER fand 18 mal den vorliegenden Theil bei der folgenden Untersuchung höher. Ich denke nun aber, dieses Festhalten darf man zum Theil auch dem Becken zuschreiben, nicht allein dem in dieser späten Zeit auch besser schließenden Uterus. Dafür sprechen gegen CHARPENTIER auch BRÜHL'S Resultate.

Ich habe in Anbetracht der ungenauen Ergebnisse, die beim fast ausschließlichen Angewiesensein auf D. B. und den einen Kopfdurchmesser zu erhalten, ferner der geringen Zahl der Beckenendlagen, mich begnügt, nur wieder die oben erwähnten verschiedenen acht Monate aus den verschiedenen

Jahren zum Vergleich heranzuziehen. Ich zählte von jedem D. B. 10, von jeder C. D. 2,4 cm. ohne Unterschied ab, indem ich den gebräuchlichen Abzügen noch 1 cm für die Weichtheile zufügte; und stellte mir vor, daß in diesen Durchmesser der nicht comprimirebare biparietale eintreten müsse. Ich betrachte nur die einfachen, nicht macerirten Früchte vom Ende des 9. Monats ab. So habe ich 33 Beckenendlagen (die „kleine C. v.“ bleibt weg) gegen 343 andre (die ich etwa mit sechs vervielfachen müßte, um die ganzen Zahlen zu erhalten, wenn sich die Verhältnisse, wie ich hoffe, entsprechen). Nahm ich eine Differenz der Durchmesser von $\pm 0,4$ nur noch als normal, so war der Kopf des Kindes

	zu klein:	normal:	zu groß:
bei $\pm 0,4$	14 : 161	4 : 75	15 : 107
„ $\pm 0,5$	10 : 132	11 : 131	12 : 80
„ $\pm 0,9$	10 : 114	14 : 167	9 : 62
„ ± 1	7 : 80	19 : 230	7 : 33

Im ersten Fall wäre das normale Verhältniß bei den Beckenendlagen halb so oft vertreten, wie bei den andern; im 2. $\frac{5}{6}$, im 3. $\frac{7}{9}$, im 4. $\frac{15}{17}$ mal.

Das Mißverhältniß ist negativ (das Becken sehr groß), auf das normale Verhältniß bezogen, 1,63 — 0,9 — 1,05 — 1,06 mal; positiv: 2,62 — 1,8 — 2 — 2,65 mal. Hier, beim engen Becken scheinen also die Beckenendlagen mit dem Grade der Verengerung eher zu steigen. Beim weiten Becken zeigen sich in diesen geringen Grenzen nur minimale Unterschiede im Allgemeinen; das sehr weite ist eben selten.

Bei acht nicht macerirten Kindern von 49 und mehr cm. Länge wurde 2 bis 28 Tage vor der Geburt auch der Kopf einmal unten gefunden, einmal allerdings nur mit Wahrscheinlichkeit; bei der sehr beschränkten Zahl von Untersuchungen Schwangerer eine stattliche Menge.

Von den 54 Frauen mit nicht macerirten einfachen Kindern in Beckenendlage hatten schon vorher in solchen Lagen entbunden eine II und eine IV p., eine IV p. 2 oder 3 mal, eine V p. das letzte mal und die Mutter der zwei kleinsten ist dieselbe m. p.

Schiefagen habe ich fast nicht berücksichtigt, weil sie so oft noch während der Geburt vom Uterus zu Schädellage umgewandelt werden (wie allseits anerkannt), vorher aber wenige untersucht wurden; dann müßten für meine Zwecke auch Schiefagen mit tiefem Beckenende, nicht bloß mit dem Kopf nach unten, unterschieden werden; es werden zwar hierher gewiß sehr viele, in der gewohnten, von praktischen Gesichtspunkten geleiteten Eintheilung als „Fußlagen“ bezeichnet, aber auch wohl manche Steißlagen gehören. So habe ich denn auch die als Schiefagen benannten Lagen zu den Kopflagen gezählt, da ich die andern nicht trennen konnte.

Ich finde, von Zwillingen und vier macerirten Früchten abgesehen, vierzehn Schiefagen notirt; wobei man sie einmal int. part. aus Schädellage entstehen sah, einmal bei einer I p. einige Tage vorher. Ausserdem wurde einmal durch Lagerung eine Schädellage hergestellt, einmal schien das spontan int. part. zu geschehen, einmal wurde »Selbstwendung« constatirt. Unter diesen 17 Frauen waren 2 I p.

Nun also: Warum gibt es überhaupt Beckenendlagen, und warum mußte gerade in einem concreten Fall der Uterus das Kind in Beckenendlage gebären? Denn was ist, muss sein! Und wenn wir »Zufall« sagen, ist das ein Wort für eine Reihe von Urfachen, die uns nicht bekannt oder nicht darstellbar sind. Dafs ich einen Weg ohne solche Brücken wandle, sage ich nicht.

»The position of the foetus in utero, with the head lowest, is a vital action«, ¹⁾ das steht fest, denn da Schwere und zufällige äufsere Einwirkungen nicht in Rechnung zu ziehen sind, bleiben nur organische Kräfte. Und auf die Frage: »what is the nature and character of this vital action«, ¹⁾ müß-

¹⁾ Simpson l. c. S. 432.

fen wir mit SIMPSON unbedingt zu dem Schluss kommen: jedenfalls Muskelkraft ist der Wächter über diese (zweckmäßige) Einrichtung; solche des Kindes oder der Mutter.

Selbst die extremsten Anhänger der Schwerkrafttheorie geben eine Wirkung des Uterusmuskels auf die Kindslage zu, indem er in den letzten Wochen das Kind in Längslage festhalte oder aus einer Schief- in Längslage bringen könne; und geben für Umstände, bei denen abnorme Lagen häufiger, eine gewisse „Formlosigkeit des Uterus“ zu.¹⁾

„It is the relation in shape of the foetus to the uterus, — of the contained to the containing body, — that regulates this position“ —²⁾, die Schädellage. Aber es ist keine starre Höhle, die den Fötus so hält, wie er vom Anfang lag, sondern dieses Ineinanderpassen bedingt nur eben eine enorme große Stabilität in der betreffenden Lage, während die Lagen selbst durch bewegende Muskelkräfte hergestellt werden, wobei das Gleichgewicht der ruhenden Muskelhöhle gestört wird.

Wir haben gesehen, daß Beckenendlagen vor allem dann seltener sind, wenn der Raum des Fötus am beschränktesten, und, was dasselbe ist, wenn die Schwangerschaft am weitesten vorgeschritten ist. Den Bewegungsraum bestimmt hauptsächlich, und zwar gegen die Geburt hin immer gebieterischer, der Uterus, und zwar durch eigene Kraft. Daß die birnförmigen oder ovalen Formen des normalen Uterus und Fötus nur bei Schädellage sich entsprechen vom Ende des 7. Monats an, kann nicht geleugnet werden, das hat auch nicht erst SIMPSON festgestellt.

Warum wird dieses schmalere untere Uterinsegment noch nachträglich zugefügt? Warum dehnt sich der Uterus, wenn er sich offenbar nicht nach allen Seiten gleichmäßig so weiter ausdehnen kann, daß er schließlich eine Kugel von 30 cm. und mehr Durchmesser bildet, gerade nach unten weiter aus?

Hier allein ist der Uterus dazu vorbereitet, hier ist ein mächtiger Anfall von leicht ausziehbarer Hohlmuskelfarbe (an die Tuben wird Niemand denken); hier allein kann das möglichst kleinste Kugelsegment ausgebuchtet — resp. ge-

¹⁾ Schröder l. c. 537. ²⁾ Simpson l. c. S. 640.

zogen werden, an jeder anderen Stelle würde eine viel größere Fläche sich mit ausbuchten müßen; hier ist mithin der Widerstand der geringste, und darum muß sich hier, am distalen Eipol, um jene Zeit, wo der Uterus nicht mehr in allen Richtungen die große Kindsaxe gleich gut erträgt, wo diese den Durchmesser des Eies erreicht hat, ein Ende derselben einsetzen. Ist dieses untere Ende der Steiß, so kann er doch nur unter abnormen Verhältnissen unten bleiben, denn die sich bewegenden Beine finden vielleicht schon am Contractionsring, jedenfalls aber am mütterlichen Becken¹⁾, in das hinein ja das Segment gedehnt wird, Widerstände, die es mit sich bringen, daß der Steiß nach der davon abliegenden Seite weg zu gleiten bestrebt sein muß. Der Uterus setzt auch der Einkeilung dieses breiten Theils mit seinen Knorren und Füßen, der ein breiteres Segment zugleich auszubuchten sucht, einen viel stärkeren Widerstand entgegen, wobei, weil derselbe langsam überwindbar, leichter und öfter Lagewechsel eintreten, als dem schmälern andern Kindsende, das sich mit der Höhe seiner Rundung in den Kanal einbohrt. Bei der Maceration kann eine bereits eingetretene Anpassung wieder weniger vollständig und zur Stabilität der Lage weniger zwingend werden durch die Erschlaffung; SIMPSON nahm allerdings das Erlöschen der Bewegungen als einzige Veränderung, und kam auf diese Weise zur Feststellung einer »vital action«.

Das für die Bildung des normalen unteren Uterinsegmentes vorausgesetzte regelmäßige Vorkommen von Schwangerschaftscontractionen bezweifelt wohl Niemand mehr; eine Hauptsache bleibt indessen selbstverständlich die Wachsthumsenergie des Kindes; mit diesem festen Keil kann der Uterus doch sicher leichter arbeiten, als mit einem Ei mehr flüssigen Inhaltes.

Wenn man den directen Einfluß der Bewegungen des Kindes auf seine Verlagerung durchaus negiren will, kann man doch zugeben, daß bei Steißlagen um diese Zeit die Bewegungen den Uterus mehr mißhandeln und so Contrac-

¹⁾ Meeh, Archiv f. G., Bd. XX, S. 195.

tionen erregen müssen, so daß auch hier das Leben des Kindes seine Bedeutung behält.

So, meine ich, bedingen sich Schädellage und unteres Uterinsegment gegenseitig. Contractionsring und Becken forgen für die schmale Gestalt dieses Theiles, und wirken sie auch bei Wiederholungen der Geburt immer etwas weniger, so glaube ich doch nicht, daß der active Rand des passiv ausgedehnten Segmentes so unkräftig werden kann — normalerweise —, daß er eine ellipsoide Uterusform zulasse; auch das Becken nimmt das mächtigere Kindsende nur selten vor der Geburt dauernd auf ¹⁾.

BANDL ²⁾, der wenigstens von der Ansicht frei war, als ob die Schwere des vorliegenden Kopfes das untere Uterinsegment ausbuchte, aber allerdings noch an die Schwere des ganzen Eies als einzig wirkend glaubte, so daß er aber doch die bei Längslage des Fötus größere Druckhöhe berücksichtigen sollte, sagt: „enges Becken, schlaaffe Bauchmuskulatur, fehlerhafte Kindslage, geringes Gewicht der Frucht schieben seine Entwicklung hinaus, aber es geschieht dies auch zweifellos in manchen Fällen, wo man scheinbar gar keine Ursache auffinden kann“.

Aber auch nachdem ein ganz normales, kräftiges unteres Segment, mit dem Kopf darin, ausgebildet ist, scheinen noch Lagewechsel vorkommen zu können. Ist es ja doch bei Untersuchungen über Lagewechsel oft genug beobachtet, wie der schon völlig in's Becken eingetretene Kopf wieder in den Fundus gelangte. Wie sind nun auch so schwer zu bewirkende Wechsel möglich?

Hier können Streckungen der Beine kaum mehr Erfolg haben, als den Uterus da, wo Füße und Steiß sich anstemmen, auszubuchten. SCHATZ glaubt, daß bei den Versuchen des Kindes, seinen Körper zu strecken, die Hacken nach der Bauchseite hin auf der nachgebenden Uteruswand fortgleiten; selbst für diese Bewegung (an die von MEEH beschriebene ist unter so schweren Umständen gar nicht mehr zu denken, glaube ich), die unter günstigeren Umständen wohl eintreten

¹⁾ Budin I. c. ²⁾ Über d. Verhalten des Uterus u. Cervix etc. 77.

kann, sind da, so scheint mir, die Widerstände zu groß, resp. es müßte die Streckung zu methodisch und dauernd kräftig erfolgen, als daß ich sie einem solchen willenlosen Wesen zu-trauen könnte. Der Uterus ist jedenfalls methodischerer Be-wegungen fähig, wenn auch ebenso wenig vom Willen ab-hängiger und nicht eben sparsam auszunützend.

Daß, wie MEEH schreibt, die Beine im Fundus deshalb keine Lagewechsel, nur Ausbuchtungen hervorriefen, weil die Bauchhöhle „unter einem Druck um 0 herum“ steht, ist freilich nicht richtig. MEEHS und KEHRERS Versuche, daß ein Hund, frei in einem Sack aufgehängt, ohne besondere Widerstände zum Abstoßen zu haben, nicht seine Lage ändern kann, und daß ein Kind in einem weitmaschigen Korbgeflecht mit dem Kopf abwärts gekehrt, seine Bewegungen einstellt, sind allerdings der Beachtung werth, wenn auch der Uterus kein rauher schlaffer Sack ist, der sich alles gefallen läßt.

Also wenigstens unter etwas schwierigen Umständen sind wir bei allen Arten von Lagewechseln auf die andere der zwei zur Verfügung stehenden Kräfte fast ausschließlich angewiesen, auf die, welche die Schwangerschaft endet, die Muskelkraft des Uterus; während ich allerdings nicht einsehe, warum wir, um nach KRISTELLER zu argumentiren, die Muskelkraft des Fötus, die doch nach der Geburt genug leisten kann, durch die überhaupt alle Lebensäußerungen des Menschen geschehen, vorher zu nichts nütze halten sollen, als zur Er-regung von Wehen, wie das KRISTELLER¹⁾ thut. Daß aber Kindsbewegungen und Lageänderungen in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, ist schon öfter beobachtet, so von SCANZONI, von MÜLLER, von FASBENDER; HÖNINGS Beobach-tungen beweisen, daß Bewegungen auch ohne Lagewechsel erfolgen können, und er giebt an, daß er nur ruckweises Stoßen gesehen. Jener Analogieschluß KRISTELLERS, der sich weigert, für die „so innig zusammenhängenden Schwangerschafts- und Geburtsbewegungen zwiefache Kräfte“ anzuerkennen, folgt übrigens nur der Beweisführung SIMPSONS, der M. HALL²⁾

¹⁾ M. f. G. 5, S. 401 ff.

²⁾ Aus dessen New Memoir on nerv. Syst. 1843 p. 51.

für die Reflexbewegungen der Glieder citirt: „These acts are found to preside over two important classes of functions, viz. those of preservation of the individual, and of the propagation of the species“ und das auch auf den intrauterin lebenden Menschen überträgt. Sind aber nicht auch viele Uterincontractionen reflectorisch?

KRISTELLER hat nun also zuerst die Uterincontractionen in ausgedehntester Weise zur Erklärung der Lagewechsel verwerthet, wobei er mir freilich etwas zu weit gegangen zu sein scheint. Bei todten Kindern allerdings, bei denen ja, abgesehen von den auf Lageveränderungen noch nach dem Tod deutenden eigenthümlichen Windungen der Nabelschnur, die sie oft fast abdrehen; und abgesehen von den Verhältnissen der Lagen bei der Geburt, die nur durch postmortalen Lagewechsel zu erklären sind, auch direkt noch Wechsel nachgewiesen sind¹⁾, da wird er Recht behalten müssen, trotz BRAUN, der nur von Wechselln bei lebenden Kindern wissen will. Aber gerade die macerirten Früchte könnte man auch wieder zum Beweis der Wichtigkeit der Kindsbewegungen heranziehen, in so fern als das bei verminderter Anpassung leicht durch den Uterus in Beckenendlage gebrachte Kind deshalb so lange in dieser Lage bleiben könnte, weil keine an das Becken der Mutter anstossenden lebenden Beine es daraus vertrieben.

Wie KRISTELLER den Mechanismus beschreibt, erscheint mir nicht als richtig: wenn der Uterus alle seine Muskeln in gleicher Weise verkürzte, wäre selbst dann keine Bewegung denkbar, wenn er eine Hohlkugel mit überallhin gleichen Widerständen gegen die nach aussen drückenden Kräfte bildete, viel weniger noch, wenn er länglich den länglichen Fötus enthält. Dieser wird sich nur krümmen und der Anstempfpunkt von Steiss und Schädel an den Uterus wird sich bei beiden etwas weiter rückwärts verlegen; höchstens könnte dann die bei übermässiger Knickung an den Uterus anstossende Rückseite des Fötus das dem Ort dieses anstossenden Punktes nähere Kindsende wegdrücken. Aber sind denn wirklich die

¹⁾ Scanzoni. Lebrb. IV, Aufl. I. 118: „oft beobachtet“; etc.

Widerstände gegen vorübergehende Ausbuchtung überall gleichmäfsig? KRISTELLER sagt einmal: „Das Entweichen (des Kopfes) ist um so nothwendiger, als der in seinem Querdurchmesser erweiterte Uterus der Stirn und dem Gesicht keine gröfsen Widerstände entgegensetzt, als die leicht verschiebbare Masse des liq. amnii, während der in collipetaler Richtung drückende Funduspol von dem Hinterhaupt des Kindes wie von einer schiefen Ebene abgeleitet“. Und darin scheint mir das einzig Richtige zu liegen.

Dafs theilweise Contractionen vorkommen, ist ja schon lange bekannt; es genügen aber auch solche allgemeine, die nicht überall mit gleicher Kraft geschehen, oder bei denen die Widerstände gegen eine Ausbuchtung von innen her nicht überall gleich sind — wobei natürlich auch die den Uterus umgebenden Theile zu berücksichtigen. Eine jede Gestaltveränderung des Uterus, jede Contraction, die unfrem Auge mehr als nur eine reine Aufrichtung des Organes zeigt, mufs eine theilweise sein, wenn nicht dabei ein Theil des Inhaltes entfernt wird, also bei der Geburt; die Ausbildung des unteren Segments dagegen geschieht zu langsam, als dafs wir sie sehen könnten.

Nehmen wir nun an, der Fötus habe eine Längslage, und die Längsmuskeln des Uterus ziehen sich vorwiegend zusammen, so wird an sich schon das Bestreben im Uterushalt vorherrschen, in die Quere sich auszubreiten; aber der Fötus ist zusammengedrückt, und er kann sich nur in Bewegung setzen, wenn in einem der grofsen Axe des Eies, die ja durch seinen Scheitel und Steifs geht, unmittelbar benachbarten Durchmesser die Widerstände geringer sind, wenn ein dem vorher gröfsen Uterindurchmesser benachbarter in Folge der Verkürzung jenes mehr geneigt ist, der gröfste zu werden. Je stärker dabei der Fötus eingezwängt und zusammengedrückt ist, desto mehr wird er vermöge der Elasticität seiner Wirbelsäule bestrebt sein, aus der Lage zu kommen. So wird also bei alleiniger Contraction der medialen Längsfasern des Uterus, wenn sich nicht gleich die Cervix eröffnet, der Fötus gezwungen sein, eine Querlage anzunehmen. Und wie aus

völliger Querlage eine Geradestellung möglich ist, hat ja KEHRER beim Kaninchen direkt gesehen; dazu ist eine vorwiegende Contraction der Querfasern nötig. Dafs dabei immer wieder dasselbe Kindsende in den von ihm vorher eingenommenen Uterintheil zurückkehre, ist natürlich nicht nöthig. Geschieht es aber, und Fötus und Uterus passen bei dieser Lage nicht recht ineinander, so mufs bald wieder eine Lageänderung erfolgen. Dafs dabei die Schwere ganz einflusslos sei, behaupte ich nicht, aber das kleinste Muskelbündel kann die paar Gramm nach der anderen Seite jagen: und wir brauchen diese in dieser Hinsicht zu minimal wirkende Kraft nicht zur Erklärung.

Sobald also der Uterus seine eigentliche Mittellage, die Kugelgestalt, erstrebt, wird aus Quer- Längs- oder aus Längs-Querlage, und die Stabilität der Längslage rührt nur von dem unteren Uterinsegment her, in welchen Ansatz an die Kugel wieder nur der Kopf normaliter paßt, so, dafs nicht jeder Contraction ein Wechsel folgen mufs.

Warum aber contrahirt sich der Uterus? Wäre keine Contraction in der Schwangerschaft möglich, so gäbe es auch keine Geburt: denn diese wird durch die gleichen Reize, nur gehäuft und stärker, ausgelöst. Die Ursachen, die die Muskeln, zum grofsen Theil reflectorisch, erregen können und oft erregen, sind genug bekannt. Die Erregung wird begünstigt durch automatische Centra im Uterus selbst. Als Reize können, wie mechanische Einflüsse von ausen, natürlich auch Druck und Kindsbewegungen von innen wirken. Diese selbst können wieder einfach impulsive¹⁾, oder Reflexe, die freilich durch den Uterus durch angeregt werden müssen, oder instinctive sein. Bei den letzteren ist vielleicht, wie schon erwähnt, ein Einflufs der Schwere denkbar durch die veränderte Blutfüllung der Nervencentren gegenüber der gewohnten horizontalen Lage.

(Durch Contractionen des Uterus in der Nähe der Stelle, wo der Rücken liegt, können natürlich sehr leicht Stellungswechsel erzeugt werden: doch scheint mir die Schwere hier nicht zu verwerfen).

¹⁾ Im Sinne Preyers, f. dessen „Seele des Kindes“ S. 124.

So hätten wir nun also den Lagewechsel, und zwar, nicht wie SIMPSON, der, vordem die Häufigkeit der Wechsel bekannt war, sie auch nicht zu erklären im Stande war, einen recht ausgiebigen und vielfach zu Beckenendlagen führenden. So kommen wir denn auf die Ursache dieser: „die Häufigkeit einer Kindslage kann am besten erkannt werden bei genügender Kenntniss der Ursachen ihrer Veränderung“¹⁾. Dafs die meisten Lagewechsel bis zum Ende der Schwangerschaft hin unter denselben Umständen vorkommen, bei denen auch abnorme Lagen sich bei der Geburt am häufigsten finden, ist so bekannt, dafs ich es kaum besonders hervorheben mufs. Doch fehlt hier noch ein Moment: denn in manchen Fällen begünstigt gerade eine gewisse Stabilität in abnormer Lage die Geburt in solcher, so besonders bei sehr mächtigen, harten Kindsköpfen, bei macerirten Kindern. Das vollständige Gesetz folgt später.

Wenn man nun einen Blick in die Tabellen bei jenen Untersuchungen wirft, so meine ich, mufs jedem die Frage auf der Zunge liegen: war es an sich nöthig, dafs die in Beckenendlage geborenen Kinder so zur Welt kamen oder lagen sie nur zufällig so, als aus irgend welcher Ursache die Geburt erfolgen mufste, d. h. liegt der Grund für gewöhnlich in einem (wir sagen eben »zufälligen«) Zusammentreffen der Wirkungen zweier, allerdings nicht in ihrem ganzen Verlauf zu trennenden, Reihen von Ursachen, deren eine Reihe zur Zeit Beckenendlage, deren andere zu derselben Zeit Geburtswehen bewirkte?

Bei 11 unter 42 Mehrgebärenden und 6 von 42 I p. vor der Geburt von FASBENDER²⁾ öfter untersuchten Schwangeren, bei denen überhaupt Steifslage notirt, war auch schon der Schädel im unteren Gebärmutterabschnitt gefunden worden, oder kam dann herunter, oder es fand sich beides. In 4 dieser Fälle erfolgte die Geburt in Beckenendlage.

Bei HÖNING³⁾ sehe ich daselbe bei den 11 von 34 pl. p. 8 von 53 I p.; dabei eine Geburt in Beckenendlage.

Bei SCHRÖDER⁴⁾ je 3 von 18 Mehr- und 43 Erstgebärenden — keine Geburt in der Lage.

¹⁾ Meek 1. c. S. 192. ²⁾ 1. c. ³⁾ 1. 1. ⁴⁾ „Schwangerschaft etc.“ 1867, S. 21 ff.

Bei der zweiten Reihe CREDÉS¹⁾ bei den 35 unter 140 Unterfuchten; 3 Geburten i. d. L.

Bei SCHULTZE²⁾ bei 7 unter 30 pl. p., 4 von 24 I p.; nachdem ich die erst in der letzten Woche in die Unterfuchung eingetretenen abgezählt.

Alle diese Beckenendlagen stammen aus den letzten 3 Monaten, die meisten aus den letzten Wochen, so daß durch Eintritt der Geburt in der Zeit einer Beckenendlage immer ein lebendes Kind hätte zur Welt befördert werden können, von den zwei macerirten CREDÉS etwa abgesehen.

Bei häufigeren Unterfuchungen stellte sich heraus, daß Steifslagen immer nur einige Tage dauerten (HÖNING, der täglich unterfuchte, findet $4\frac{1}{4}$ bei pl. p. und 5,4 bei I p.) Bei FASBENDER aber z. B. ist die Stabilität einer Steifslage durch die letzten 3 Monate hindurch aufgezeichnet — aber bei nur sechs Unterfuchungen: welche Veränderungen können nicht dazwischen gefallen sein? Daß es solche Stabilität gibt, leugne ich nicht nur nicht, sondern verlange es für einzelne abnorme Fälle, aber solche finden sich nicht bei jenen Unterfuchungen; ein beinloser Hydrocephalus würde sicher solches bieten. BUDIN³⁾ gibt auch an, daß der Steifs, ebenso wie der Kopf, wenn auch nur selten, sogar während der letzten Wochen im Becken stehen könne, und PINARD nimmt für einzelne Fälle eine Accomodation des Kindes in Beckenendlage an den Uterus an. Fast immer aber werden sich Steifslagen wieder und wieder in Schädellagen wandeln.

Ich will bei diesen veränderlichen bleiben. Wenn ich nachsehe, in welchen Lagen hätten die Geburtswehen die Kinder am Ende des 9. oder 8. Monats getroffen, dabei immer den auf den 252. oder 224. Tag folgenden Unterfuchungsbefund wähle, wenn nicht an diesen Tagen selbst unterfucht ist, so finde ich 14 Beckenendlagen unter 302 resp. 124 Fällen. Ich fand in hiesiger Anstalt im 10. Monat 9: 212, und im 8. und 9. Monat 6: 73, VEIT für die letzteren 39: 287 Geburten. Das stimmt in der That. Bei den Unterfuchungen über Lage-

1) Obs. de foetus situ etc. 1864. 2) Unterf. ü. d. Wechsel etc. 1868.

3) l. c., wo auch über Pinard referirt.

wechsel müßte es nicht allzuschwer fein, die Zunahme des Zwangs zur Schädellage genau zu eruiren, wie er von den Fällen an, die fast jeden Tag Steifslage zeigen, bis zu denen, die sie nie haben, fortschreitet.

Ich schliesse: Wenn in einer Zeit, wo die noch nicht so vollkommene Accomodation zwischen Frucht und Fruchthälter die Constanz der Schädellage noch nicht so gebieterisch fordert, die Geburt eintritt, so wird, da Lageveränderungen häufiger sind, auch eine andere Lage häufiger von den Wehen angetroffen, und „eine bestimmte Kindslage wird . . . um so häufiger gefunden, je häufiger sie entsteht, und je länger darin die Bewegungshemmung und Ruhepause dauert“¹⁾. Der Einfluß des Uterus ist wieder deutlich als weit vorwaltend ausgesprochen. Wie er falschen Lagen wehrt, davon habe ich schon gesprochen; und es könnte in der Frage nach der Ätiologie der Kindslage meiner Meinung nach nur noch ein Streit darüber möglich sein, welchen Antheil man den Muskeln des Kindes und des Uterus am Lagewechsel zurechnen soll.

Hingegen ersieht man aus jeder Zusammenstellung der ursächlichen Momente der Beckenendlage, daß es kein einzelnes Moment, noch einen Complex von solchen für unsre jetzige Einsicht giebt, die diese Lage so begünstigen, daß die Geburt in derselben dabei öfter als die mit dem entgegengesetzten Körperende voran stattfände (von Abnormitäten besondrer Art etwa abgesehen). Aber überall leuchtet der Uterus als das vornehmste die Lage bestimmende und regulierende Moment hervor, und zwar hängt alles von den Grenzen des unteren Uterinsegmentes ab, die wieder der Contractionsring vor allem bestimmt.

Ich möchte mit Bezug darauf folgende Fälle, resp. Uterinformen unterscheiden:

- I. Zwang zu a) Schädellage, oder je nachdem auch
- b) Beckenendlage, bei bestimmten Mißbildungen des Kindes. Überhaupt Zwang zum Vorliegen des schmälern Kindsendes: ovoide oder Birn-Form, eventuell umgekehrt bei

¹⁾ Meeh, l. c. S. 195.

c) Mißbildungen des Uterus.

2. Zwang zur Längslage, gleichgültig welcher: ellipsoide Form.
3. Freigabe aller Lagen außer der queren: erweitert ellipsoide Form.
4. Freigabe aller Lagen: sphärische Form.

Als vorübergehende Übergangslage ist allerdings gewöhnlich jede Lage bei jeder Form möglich.

Dabei ist bei der letzten, auch schon vorletzten Form, die Lage des spec. Schwerpunktes nicht mehr gleichgültig. Und hier wird auch die Schwere Lageveränderungen bewirken; bei 3 freilich nur selten in ganz vereinzelt Fällen (die den Übergang zu 4 bilden) weiter, als aus der Längs- in die entsprechende Schiefslage und umgekehrt.

Die Anziehungskraft der Erde wird wenigstens dafür sorgen, daß der Rücken des Kindes nicht der von ihr abgewandten Uterininnenseite anliegt, wenn sie auch das eine Kindsende im Allgemeinen nicht viel tiefer zu stellen vermag, als das andre, und die Geburten mit dem einen voran nicht häufiger zu machen (vgl. die Geburten der ersten Schwangerschaftshälfte. Daß durch die Wehen viel mehr Beckenendlagen als Kopflagen aus queren entstünden, glaube ich nicht).

Bei den 3 letzten Formen können die Kindsbewegungen noch wenigstens dadurch die Frequenz der Beckenendlagen mindern, daß sie das Beckenende vom Becken der Mutter wegstoßen; so bei den vielfach zur 2. Form gehörigen Fällen von Placenta praevia, Hydro- und Anencephalus etc.

Im Allgemeinen würde ich das Vorkommen der Formen etwa so bestimmen:

Die 3. und 4. Form zusammen etwa in 6 von 100 Fällen. Es sind nämlich die Schiefslagen diesen Formen allein eigenthümlich, und die mit tiefem Kopf betragen ca. 10/100, die mit tiefem Beckenende wohl ebensoviel, und wir hätten sonach hier drei Hauptrichtungen der Kindsaxe, deren Häufigkeit wir etwa gleich und zu je 10/100 vorläufig setzen können (wenn auch der Bezirk der schiefen Lagen bei der 3. Form etwas eingeschränkt ist, so ist dafür der der noch als „gerade“ zu bezeichnenden Lagen im Allgemeinen kleiner), nämlich:

1) Gradlage, 2) Schiefelage mit dem Kopf oder Beckenende auf dem rechten Darmbein und 3) ebenso auf dem linken. So hätten wir, wenn wirklich die sogenannten Schiefelagen $1\frac{0}{10}$ ausmachten, die Häufigkeit dieser Formen zu $3\frac{0}{10}$ zu bestimmen. Aber das ist offenbar zu wenig; die Selbstwendung, und damit auch die Schiefelage wird bei Frühgeburten (und gar erst bei Aborten) oft übersehen. Die Geburten bis zum 7. Monat incl. bilden offenbar den größten Theil der Fälle der 3. und 4. Form, und gehören wiederum mit Ausnahme nur einiger wenigen nicht macerirter Früchte vom Ende des 7. Monats dieser Gruppe zu. Ich finde 39 nicht mac., 37 mac. Früchte aus den ersten 7 Monaten und 9 Aborte (Zwillinge rechne ich nicht), also 82 unter 2104 gleich $4\frac{0}{10}$. Unter diesen 82, bin ich überzeugt, wären, wenn die Lagen zwischen Schwangerschaft und Geburt hätten bestimmt werden können, etwa $\frac{1}{3}$ als Schiefelagen zu notiren gewesen; wie man ja $\frac{1}{3}$ bis zur Hälfte dieser Geburten in Beckenendlage vor sich gehen findet — meinen Voraussetzungen entsprechend (eine Art von Probe auf dieselben; wenn die Uterusform ganz allein maassgebend wäre, wie hier einmal angenommen, müßte es freilich die volle Hälfte sein). In der That sind nur 4 Kinder, mac., darunter in Schiefelage getroffen worden; nach dem 7. Monat 17: und so hätten wir, meine Behauptung als richtig angenommen, $17 + \frac{82}{3} = 44$ Schiefelagen unter 2104 Geburten oder $2\frac{0}{10}$ und es wäre $x = 3$ mal 2.

Die 2. Form etwa $4\frac{0}{10}$, die Beckenendlagen zu $4\frac{0}{10}$ gerechnet, also $x = 2$ ($4 - \frac{6}{3}$) = 4.

Die erste in den übrigen $90\frac{0}{10}$.

KRISTELLER hat aus DUBOIS' Zahlen die Zunahme der Beckenendlagen mit der Abnahme der Accomodation von den lebenden und todtten reifen Kindern bis zu den lebenden und todtten Frühgeburten hübsch dargestellt: er fand 2 — 11 — 23 — $36\frac{0}{10}$.

Würde ich nun gefragt, warum ist dieses oder jenes Kind in Beckenendlage geboren worden, so könnte ich nur sagen: Weil es in den letzten Wochen vor der Geburt (bei manchen Mißbildungen auch schon früher), einmal durch Be-

wegungen des Uterus oder eigene (in einzelnen Ausnahmefällen auch durch Wirkung der Schwere) in jene Lage gelangt, was durch den oder jenen Umstand erleichtert war, nun entweder so festgehalten wurde, oder daß, wenn das nicht der Fall war, von keiner Seite aus ein Antrieb zu einer Lageänderung erfolgte, was wieder durch besondere Umstände begünstigt sein mochte.

SCANZONI betont ja auch schon, daß Beckenendlagen erst kurz vor der Geburt entstehen. —

Die Naturwissenschaft geht einen Schritt weiter in Beantwortung der Frage: warum ist die eine (Längs-) Lage so unverhältnißmäßig viel häufiger wie die andre.

Ich habe oben einige von SIMPSON auf das intrauterine Leben übertragene Worte M. HALLS über die Reflexe im Allgemeinen gebracht. Ich setze statt „Reflexbewegungen“, wenn ich auch die Bewegungen des Kindes als direct die Lage verändernd nicht verwerfen kann, und die des Uterus als zum guten Theil reflectorisch anerkennen muss, für meine Zwecke einiges andre ein:

Die Form des Uterus und die activen Änderungen seiner Hohlmuskelform sind Einrichtungen der Natur, bestimmt zur Ausübung zweier wichtiger Ämter, der Erhaltung des Einzelwesens und der Gattung.

Solche Einrichtungen nennt man zweckmäßig. Ziel und Zweck bei Lebewesen sind eben nur das Dasein dieser Lebewesen selbst, d. h. wenn eine Gattung lebt, mußte sie so angelegt sein, daß sie sich erhalten konnte im Kampf ums Dasein.

Frauen, die von vornherein mehr geneigt sind, Kinder in einer andern als der Schädellage den austreibenden Kräften zu übermitteln, haben *et. par.* weniger Nachkommenschaft als solche, deren Geburtstheile das Kind zur Kopflage zwingen. Eigens will ich noch erwähnen, obgleich das schon einbegriffen war: es mag dazu beitragen, ich will nicht sagen, daß

jene abnormen Weiber seltener geheirathet werden, wohl aber daß sie weniger nach Mutter»freuden« verlangen und sie mehr hintanzuhalten suchen.

Ich setze natürlich eine Vererbung der die Kindslage bedingenden Momente, der Uterinbeschaffenheit vor Allem, von der Mutter auf die grössere Zahl ihrer (weiblichen) Kinder voraus.

Da es nun Frauen gibt, bei denen wir keine für schlechte Uterinbeschaffenheit günstigen Momente finden können, und doch abnorme Lagen, ist jedenfalls der Schluss erlaubt, daß sie zum Theil solche ererbt haben müssen (denn einen Grund muß jene abnorme Beschaffenheit doch haben), und dann muß diese Art von Frauen offenbar, je weiter wir zurückgehen in die Vergangenheit, um so zahlreicher gewesen sein. Wir haben ja auch kein Recht, anzunehmen, daß der Contractionsring immer so beschaffen war, wie gegenwärtig beim Menschen, daß er nur den Kopf als passend einläßt. Er ist mit der Zeit so geworden; die Natur hat die Kindslagen so geregelt, daß nur noch ein geringer Procentsatz der Geburten nicht freiwillig und ohne Gefahr für Mutter oder Kind beendet werden kann, und zwar mußte die Regelung so erfolgen, *cet. par.*, daß sich die Häufigkeiten der Lagen von einer zur nächsten Generation umgekehrt wie ihre Gefährlichkeit verhielten, wenn die eine Mutter immer nur in Kopf-, die andre in Beckenendlage gebären würde (DARWINS »natürliche Zuchtwahl«, »Überleben des Passendsten«, wie H. SPENCER sagt). Vollständig ist das Ziel der Vertilgung aller Lagen außer Einer nicht zu erreichen gewesen, aber wir werden ihm wohl immer noch etwas näher rücken. Auch die Ärzte gehören seit uralten Zeiten zu den Factoren, welche diesem zweckmäßigen Ziele wehren (ähnlich wie sie durch die Brillen der Verbreitung der Kurzsichtigkeit Vorschub leisten etc.), indem sie die der Natur durch sie selbst gelieferten Geburtshindernisse mit Zange und Wendung vor allem einigermaßen unwirksam machen (so daß der Arzt in gewissem Sinne Ursache der Krankheit ist); dann aber erfolgen immer wieder Rückschläge zu abnorm weiten Uterusformen und sie werden oft erworben:

so lange Rachitis und Cachexieen jeder Art bestehen, so lange es nicht gelingt, die Erweichung und Erschlaffung von Uterus und Bauchwand, durch die Geburten selbst, mit Binden und Bandagen zu hindern, so lange wird es auch noch andre Lagen als die Schädellage geben; ja vielleicht so lange Uterincontractionen bestehen, die mit dem Inhalt des Organs das Ei vor seiner Anheftung in den unteren Theil der Gebärmutter treiben — auch so lange wir nicht Zwillinge, Frühgeburt und intrauterinen Tod abschaffen.

Sogar aber schon unter meinem kleinen Material sind einige Primiparae, für die ich keine Momente finde, die ihnen einen die Beckenlage erlaubenden Uterus erworben hätten. 3 I p. sind bei keinem der begünstigenden Momente aufgeführt; daß solche nicht vorhanden waren, ist damit freilich nicht bewiesen. Anhaltspunkte, die für Vererbung der Anlage sprächen, fand ich ebenfalls keine, aber bei den wenigen, die danach gefragt werden, sind offenbar noch viel weniger, die darauf antworten. Und von solchen I p., bei denen kein den Uterus schädigender Einfluß vorhanden ist oder war, glaube ich, daß sie jenem frühen zahlreicheren Geschlecht angehört haben, und es werden wohl noch solche da sein.

Wie langsam eine solche natürliche Zuchtwahl schreitet, will ich an einer sehr vereinfachten Rechnung zu zeigen suchen, wobei ich außerordentlich günstige Umstände für das Erlöschen des unzweckmäßsig angelegten Geschlechtes annehme:

Ich nehme eine Zeit, wo die Hälfte der Kinder in Kopf-, die andre in Beckenendlage geboren wurde, (allerdings werden von Anfang an die ersteren ein wenig schon überwogen haben). Da entstand einmal ein besonders fester Uterus, resp. Contractionsring, der alle Kinder in Schädellage zur Welt brachte, und seine Beschaffenheit vererbte sich auch gleich (was in der Natur allerdings nicht eben sofort geschehen muß) — es war der Uterus, wie wir ihn jetzt als normal betrachten bei I p. Mit der glücklichen Besitzerin dieses Organs gab es damals erst 100 zeugende Frauen. Sie sollen jede ihre fünf Kinder in ihrem 30. Lebensjahr geboren haben,

und von den Beckenlagen wurde die Hälfte der Kinder, bei den Schädellagen $\frac{3}{5}$ wieder wie ihre Eltern fortpflanzungsfähig; die Hälfte waren weiblichen Geschlechts. Wie viele Generationen vergehen nun, bis die Nachkommen der einen Frau die der andern alle so überflügelt haben, daß sie sich umgekehrt wie damals verhalten? denn kaum bei mehr als $1\frac{0}{10}$ der Frauen dürften sich keine Momente für das Erwerben der Abnormität finden lassen. Wir haben, — da also immer von jeder Frau 1,5 weibliche Kinder nach 30 Jahren wieder 1,5 gebären, resp. 1,25 wieder 1,25 — die Gleichung:

$$\frac{1,5 \times}{100 \cdot 1,375 \times} = \frac{100}{1}$$

Also ist x ($\lg 1,5 - \lg 1,375$) = $\lg 100 + \lg 100 = 4$.

$$x = \frac{4}{0,17609 - 0,13830} = \frac{4}{0,03779} = 107 \text{ Generationen od.}$$

3200 Jahre. Nehmen wir 1000 Frauen als Ausgangspunkt,

so gäbe es $\frac{5}{0,03779}$ oder 132 Generationen = 4000 Jahre, bei

solch ungemein günstig für das Erlöschen angenommenen Verhältnissen, daß die Hälfte Beckenendlagen sein sollen, daß kein Rückschlag erfolgt etc.

Das sind die Ursachen der Beckenendlagen und ihrer Häufigkeit, wie sie mir erkennbar waren! Die vielen großen Lücken der Beweise für meine Behauptungen fühle ich wohl, aber ich hoffe doch einen kleinen Beitrag zum Beweis des Satzes geliefert zu haben, daß bei Untersuchung der Ausnahmen oft die Regel erst recht klar wird; und unser ätiologisches Zeitalter soll sich auch um solcher Ursachen Ergründung kümmern.

Es bleibt mir noch einer angenehmen Pflicht zu genügen: meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimerath Professor Dr. F. WINCKEL meinen herzlichsten Dank auszusprechen für die Aufgabe und Überlassung des Materials, für die Lebenswürdigkeit, mit der er durch die Schätze seiner Bibliothek die Lücken der öffentlichen mir ergänzte, wie überhaupt für die Übernahme des Präsidiums.

